



MACROVITA

Seguridad y Confianza en
Salud Animal

ElectroVita

USO VETERINARIO

Electrolitos orales, Analgésico y
Vitamina C
Para el control de estrés calórico



INDICACIONES
ELECTROVITA es un polvo oral de alta potencia para combatir el estrés calórico en animales que sufren el período de adaptación al calor con síntomas de fiebre, letargo o prostración, en casos de deshidratación.

EFFECTOS
Efectos hipotermizantes y analgésicos.

CONTRAINDICACIONES
No utilizar en animales con enfermedades renales o hepáticas graves.



Presentación 100g - 1kg - 20kg

ElectroVita

Polvo soluble en agua de bebida
Electrolitos orales, analgésico y vitamina C

Descripción

Electrovita es un polvo soluble de electrolitos orales y analgésico, indicado como coadyuvante en el tratamiento de las enfermedades más comunes que causan la pérdida de electrolitos y fluidos en el organismo animal como vomito, diarrea leve o severa, ejercicio fuerte, intenso o prolongado, en infecciones bacterianas, virales o parasitarias.


Útil para prevención y tratamiento de todos aquellos procesos que causen estrés en los animales. Para la prevención de estrés por manejo adminístrese antes de realizar la actividad de manejo.

Formulación

Cada 100 g contienen:

Ácido acetil salicílico	15 g
Ácido ascórbico (vitamina C)	1.5 g
Gluconato de calcio	5.7 g
Cloruro de potasio	2.6 g
Sulfato de magnesio	0.8 g
Cloruro de sodio	25 g
Vehículo c.b.p	100 g

Especies



Indicaciones

Electrovita se recomienda para la prevención y el tratamiento de todos aquellos procesos que causen estrés y lograr el restablecimiento de los animales.

Aves: manejo de granjas, recepción de pollitos, despique, vacunaciones, estrés calórico

Porcinos: Destetes, castraciones, movimientos dentro o fuera de la unidad de producción, manejo de los animales, cambios bruscos de temperatura.

Bovinos: estrés calórico, manejos de ganado, procesos de estrés por enfermedad, convalecencia, recepción de ganado.

Caninos y felinos: deshidratación, convalecencia, recuperación de procesos diarreicos, estrés calórico, fatiga por exceso de ejercicio, recuperación post quirúrgica.

Dosis

Aves y Porcinos 100 g en 100 litros de agua de bebida

Bovinos 100g en 100 litros de agua de bebida

Equinos 1 g en 2 litros de agua

Caninos y Felinos 5 g en 10 litros de agua

Administrar durante 5 a 10 días, según la gravedad del caso.

Vía de aplicación

Oral, disuelto en el agua de bebida

Advertencias

No consumir la carne de los animales tratados hasta UN día después del último tratamiento.

No administrar en aves productoras de huevo para consumo humano.