



Seguridad y Confianza en  
Salud Animal

# Vetamox G

USO VETERINARIO

Doble acción bactericida  
Alta efectividad a nivel sistémico



Presentación 100ml - 250ml

# Vetamox G

Suspensión inyectable  
Combinación antimicrobiana sinérgica de amplio espectro.

## Descripción

**Vetamox G** es un potente antimicrobiano que combina la acción de Amoxicilina y Gentamicina.

La Amoxicilina es un  $\beta$ -lactámico, penicilina semisintética de amplio espectro con acción bactericida que actúa inhibiendo la síntesis de pared celular de los microorganismos.

La Gentamicina, aminoglucósido, bactericida de amplio espectro, actúa uniéndose a la subunidad 30's ribosomal, inhibiendo la síntesis de proteína, principalmente en bacterias Gram negativas.

## Formulación

Cada ml contiene:

Amoxicilina	150 mg
Sulfato de Gentamicina (equivalente a Gentamicina base)	40 mg
Vehículo c.b.p	1 ml

## Indicaciones

**Vetamox G** es un antibiótico de amplio espectro de acción sinérgica para el tratamiento de enfermedades infecciosas sistémicas de los animales domésticos actúa contra bacterias tanto Gram + como Gram -, susceptibles a la combinación sinérgica.

**BOVINOS, OVINOS Y CAPRINOS:** Neumonías, diarreas, gabarro, mastitis, metritis, enteritis bacteriana y abscesos cutáneos.

**PORCINOS:** Disentería, colibacilosis, enteritis bacteriana, neumonías, mastitis, metritis, septicemias, síndrome MMA.

**EQUINOS:** septicemia, infecciones respiratorias, poliartitis.

### Eficaz en el tratamiento de:

- Cuadros Respiratorios agudos
- Neumonía
- Enteritis
- Mastitis
- Metritis
- Artritis
- Bronquitis
- Diarreas
- Gabarro
- Síndrome MMA (cerdas)
- Septicemias



## Especies



## Dosis

1 ml / 10 Kg de peso vivo.

Equivalente a 15 mg/Kg de p.v. de Amoxicilina y 4 mg/Kg por p.v. de Gentamicina

Dosis por día durante tres días consecutivos.

## Vía de aplicación

Intramuscular profunda. En volúmenes altos aplicar en dos sitios de inyección para favorecer la absorción y evitar formación de edema.

## Periodo de retiro

No aplicar este producto 45 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

No consumir la leche de vacas tratadas hasta después de 4 días de la última aplicación.

## Advertencias

Agitar bien antes de usar. Al permanecer el frasco en reposo es normal la separación del producto formando dos capas, estas se reintegran fácilmente por agitación.

Protéjase de la luz.

No se deje al alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.