



MEDAZOL-50

REGISTRO SAGARPA
Q-6602-024

Contenido Neto
25 kg



INDICACIONES:



MEDAZOL-50® antihelmítico oral para cerdos, aves, bovinos y ovinos.

DOSIS:

CERDOS: 200 g de **MEDAZOL-50®** por tonelada de alimento.

LECHONES Y CERDOS EN ENGORDA: 600 g de **MEDAZOL-50®** por tonelada de alimento durante 5 días.

REPRODUCTORAS: 600 g de **MEDAZOL-50®** por tonelada de alimento durante 10 días.

BOVINOS: 10 g de **MEDAZOL-50®** por cada 100 kg de peso corporal por 3 días.

OVINOS: 1 g de **MEDAZOL-50®** por cada 10 kg de peso corporal por 3 días.

AVES: 1.5 kg de **MEDAZOL-50®** por tonelada de alimento.



FÓRMULA:

Cada 1000 g contienen:

- » 5-Benzoil-2 Benzimidazol-Carbonato de metilo 50.0 g
- » Excipiente c.b.p. 1000 g



Industrial Farmacéutica Veterinaria, S.A. de C.V.
Emiliano Zapata 200, Tlaquepaque, Jal., México. 45500
Teléfonos: 01 (33) 3123 0306, 3635 2717
www.capsa-ifv.com • atencionclientes@capsa-ifv.com