

CATÁLOGO 2019 AVES

PiSA®
AGROPECUARIA



ÍNDICE
CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PiSA® AGROPECUARIA

AVES 2019

ADITIVOS PARA EL ALIMENTO PREMEZCLA 6

ANTIMICROBIANOS 9

ANTIPARASITARIOS 11

ESTIMULANTES DE APETITO Y HEMATOPOYÉTICOS 11

TERAPIA APARATO DIGESTIVO 13

SOLUCIONES Y ELECTROLITOS 13

PREPARADOS DE USO EXTERNO 13

BIOSEGURIDAD

CONTROL DE VECTORES 14

DETERGENTES 15

DESINFECTANTES 15


PiSA®
AGROPECUARIA


Salud animal
Bienestar humano®





A.M.X.® 60% PREMIX

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-221

Fórmula:
Cada 100 g contienen:

Amoxicilina Trihidratada	60 g
Excipiente cbp	100 g

Indicaciones:
A.M.X.® 60% PREMIX es una Amoxicilina, la cual lleva un proceso de revestimiento, que la protege sobre cambios ambientales originados por el manejo, proceso, distribución y almacenaje del alimento terminado.
Está indicado para el tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la Amoxicilina en aves (pollo de engorda, reproductora pesada y pollita de remplazo): *Colibacilosis E. coli,* sinusitis infecciosa asociada a *Haemophilus paragallinarum,* artritis asociada a *E. coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus* spp. salmonelosis, cistitis, dermatitis y clostridiasis.
Vía de administración:
Oral, mezclado en el alimento.
Dosis:
aves: 330 a 660 g de A.M.X.® 60% PREMIX por tonelada de alimento durante 5 a 7 días, o a criterio del médico veterinario.
Tiempo de Retiro:
No utilizar para consumo humano la carne de aves tratadas, hasta 7 días después del último tratamiento.
Presentación:
25 kg.
USO VETERINARIO





CLOVIREL®

Reg S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-163

Fórmula:
Cada 100 g contienen:

Sulfato de Colistina	144'000,000 UI.
Excipiente cbp	100 g

Indicaciones:
Antimicrobiano usado para el control y tratamiento de enfermedades gastrointestinales causadas por bacterias Gram negativas sensibles a la Colistina como *E. coli* y *Salmonella spp.*, en aves en todas las etapas productivas (pollo de engorda y gallina de postura).
Vía de administración:
Oral, mezclado en el alimento.
Dosis:
Control:
125 g de CLOVIREL® por tonelada de alimento durante 15 días.
Curativa:
Aves: 250 g de CLOVIREL® por tonelada de alimento durante 15 a 21 días.
Presentación:
25 kg.
USO VETERINARIO





COCCIMAX®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-239

Fórmula:
Cada 100 g contienen:

Decoquinato	12 g
Excipiente cbp	100 g

Indicaciones:
COCCIMAX®: Previene el desarrollo de las coccidias y el daño causado por éstas. Minimiza las pérdidas causadas por la coccidiosis subclínica. Duración de actividad más prolongada, disponible para prevenir la coccidiosis con efectividad.
Aves (pollo de engorda y pollita de reemplazo): Prevención de coccidiosis causada por *E. tenella, E. necatrix, E. acervulina, E. mitis, E. máxima* y *E. brunetti.*
Vía de administración:
Oral, mezclado con el alimento.
Dosis:
Para prevención de coccidia en aves:
250 g de COCCIMAX® (30 ppm de Decoquinato) por tonelada de alimento. Uso continuo.
Advertencias:
No administrar en gallinas reproductoras o ponedoras en producción de huevo para consumo humano.
Presentación:
25 kg.
USO VETERINARIO





COCCILIBER®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-167

Fórmula:
Cada 100 g contienen:

Monensina Sódica Equivalente a Monensina	40 g
Excipiente cbp	100 g

Indicaciones:
Indicado en aves (pollo de engorda, pollitas de reemplazo y pavos) para la prevención de coccidiosis.
Vía de administración:
Oral, mezclado con el alimento.
Dosis:
Aves: Pollo de engorda de 100 a 125 g de Monensina por tonelada de alimento (250 a 312.5 g de **COCCILIBER®** por tonelada de alimento), hasta la salida de las aves al mercado.
Pollitas de reemplazo de 100 a 120 g de Monensina por tonelada de alimento (250 a 300 g de COCCILIBER® por tonelada de alimento) hasta las 16 semanas de edad.
Pavos de 60 a 100 g de Monensina por tonelada de alimento (150 a 250 g de **COCCILIBER®** por tonelada de alimento) hasta las 16 semanas de edad.
Periodo de Retiro:
El sacrificio en las aves destinadas a consumo humano debe esperar, por lo menos, 1 día posterior a la última administración del producto. No se administre a pavos o pollas de reemplazo mayores a 16 semanas.
Presentación:
25 kg.
USO VETERINARIO





NEUMOENTER® PLUS

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-137

Fórmula:
Cada 100 g contienen:

Clorhidrato de Clortetraciclina	15 g
Fumarato Hidrogenado de Tiamulina	5 g
Excipiente cbp	100 g

Indicaciones:
Neumoenter® Plus es una premezcla antimicrobiana para ser administrada en el alimento de aves (pollo de engorda, pollita de reemplazo, gallina ponedora comercial, gallina reproductoras). Esta combinación posee características diferentes. ya que su efecto le permite controlar enfermedades, contribuyendo a mejorar la velocidad de crecimiento y conversión alimenticia de los animales afectados.
Asimismo es indicado para la prevención y tratamiento de las enfermedades de las aves como *ERC y ERCC*, coriza infecciosa y cólera aviar.
Vía de administración:
Oral, mezclado con el alimento.
Dosis:
Pollo de engorda y gallina reproductora:
2 kg por tonelada de alimento durante 7 días. Este nivel proporciona 100 ppm de Tiamulina y 300 ppm de Clortetraciclina.
Advertencia:
No se administre a pavos o pollas de reemplazo mayores a 16 semanas.
No administrar en gallinas reproductoras o ponedoras en producción de huevo para consumo humano.
Periodo de Retiro:
El consumo de carne de las aves tratadas deberá esperar, por lo menos, 7 días posteriores a la última administración. No administrar en gallinas reproductoras o ponedoras en producción de huevo para consumo humano.
Presentación:
6 kg y saco de 25 kg
USO VETERINARIO





NEUMOENTER® PREMIX

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-171

Formula:
Cada 100 g contienen:

Clortetraciclina granular	20.0 g
Excipiente cbp	100.0 g

Indicaciones:
Está indicado para la prevención y control de problemas respiratorios y digestivos causados por gérmenes sensibles a la Clortetraciclina. Previene infecciones en periodos de estrés.
ECR, sinovitis infecciosa y *E. coli.*
Vía de administración:
Oral, mezclado con el alimento.
Dosis:
Clortetraciclina granulada 20% kg/ton

Prevención y control:	1.0 kg
Profilaxis:	2.0 kg
Sinovitis infecciosa:	2.5 kg
Mortalidad por *E. Coli:*	2.5 kg

Presentación:
Saco de 25 kg.
USO VETERINARIO







MAXIFOLIPOL®
Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-136

Fórmula:
Cada 100 g contienen:

Flavofosfolipol	4 g
Excipiente cbp	100 g

Indicaciones:
Mejorador de la productivad en aves.
Se usa como antibiótico en aves (pollo de engorda, gallina ponedora y pavos). Es efectivo en el control de bacterias que proliferan en situaciones de alta producción, por ejemplo Gram positivas, como *Enterococcus spp.* y *Clostridium perfringens* y Gram negativas como *Salmonella enteritidis, E. coli, Pasteurella spp.* y *Brucella spp.,* que se encuentran en el tracto digestivo.
Vía de administración:
Oral, mezclado con el alimento.
Dosis:

Flavofosfolipol	Maxifolipol® (g/ton)	Equivalente a Flavofosfolipol (sustancia activa) (g/ton)
Aves		
Pollo de engorda	62.5 a 125	2.5 a 5
Gallinas ponedoras y reproductoras	100	4
Pavos	100	4

Periodo de retiro:
En aves son cero días de retiro en carne y huevo.
Presentación:
25 kg.
USO VETERINARIO



PROTECTYL®
Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-268

Fórmula:
Cada 100 g contienen:

Fosfato de Tilosina	40 g
Excipiente cbp	100 g

Indicaciones:
Está indicado en aves (pollos de engorda y pollitas de reemplazo):
Para la prevención y tratamiento de enfermedad crónica respiratoria producida por *Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae* y otros microorganismos sensibles a la Tilosina.
Vía de administración:
Oral, mezclado con el alimento.
Dosis:
En pollos de engorda para incrementar la ganancia de peso y la eficiencia alimenticia proporcionar 4 a 50 ppm de manera continua (10 a 125 g de Protectyl® por tonelada de alimento).
Para la prevención y tratamiento de en pollo de engorda 800 a 1000 ppm (2 a 2.5 kg de Protectyl® por tonelada de alimento) y en pollitas de reemplazo 1000 ppm (2.5 kg de Protectyl® por tonelada de alimento). Para mejorar la eficiencia alimenticia en pollitas de reemplazo de 20 a 50 ppm (50 a 125 g de Protectyl® por tonelada de alimento).
Periodo de Retiro:
En aves en general medicadas a una dosis de 4 a 50 ppm no requiere tiempo de retiro. El sacrificio de aves que recibieron una dosis de 800 a 1000 ppm; destinadas a consumo humano debe esperar, por lo menos, 5 días posteriores a la última administración del producto.
Presentación:
Saco de 10 kg con bolsas de 1 kg.
USO VETERINARIO



ECTOSIN® 0.6% PREMIX
Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-109

Fórmula:
Cada 100 g contienen:

Ivermectina	0.6 g
Excipiente cbp	100 g

Indicaciones:
ECTOSIN® 0.6% PREMIX: Controla los nematodos intestinales y los parásitos externos (ácaros y piojos) de las aves.
Vía de administración:
Oral, mezclado con el alimento.
Dosis:
Aves: 100 a 400 µg/kg de peso por un periodo de 3 a 7 días según lo indique el Médico Veterinario.
Tiempo de Retiro:
- En carne de aves un día.
- En huevo cero días.
Presentación:
5 kg.
USO VETERINARIO



CAREBUMINA® 25%
Reg S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-135

Fórmula:
Cada 100 g contienen:

Fumarato Hidrogenado de Tiamulina	25 g
Excipiente cbp	100 g

Indicaciones:
Antibiótico para el control y tratamiento de enfermedades causadas por *Mycoplasma gallisepticum* y *Mycoplasma synoviae* y otros microorganismos susceptibles.
Está indicado para el control y tratamiento de la enfermedad respiratoria crónica causada por *M. gallisepticum* y *M. synoviae.*
Vía de administración:
Oral, mezclado con el alimento.
Dosis:

Aves Tratamiento E.R.C.	Dosis (ppm)	g/ton
Pollo de engorda	30	120 continuos por 21 días a partir de la 1ª semana de vida.
Reproductoras (ligeras, pesadas)	200 50	800 por 1 semana 200 por 4 semanas

Periodo de Retiro:
El consumo de carne de las aves tratadas deberá esperar, por lo menos, 14 días posteriores a la última administración. No administrar en gallinas reproductoras o ponedoras en producción de huevo para consumo humano.
Presentación:
25 kg.
USO VETERINARIO



NF 180® NFL
Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-107

Fórmula:
Cada 100 g contienen:

Florfenicol	2 g
Excipiente cbp	100 g

Indicaciones:
NF 180® NFL premezcla antibiótica de amplio espectro, indicada en el tratamiento de las enfermedades bacterianas de las aves (pollo de engorda y polla de reemplazo) y aves de combate producidas por gérmenes susceptibles al Florfenicol como son*: Shigella spp., Corynebacterium spp., Pasteurella spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., Haemophilus spp., Avibacterium paragallinarum, Escherichia coli, Ornithobacterium rhinotracheale, Clostridium spp., Streptococcus spp.*
Vía de administración:
Oral, mezclado en el alimento.
Dosis:
Mezclar de 1 a 2 kg de NF 180® NFL por tonelada de alimento (equivalente a 20-40 ppm). Se recomienda por lo general durante un período de 7 días. La dosificación y el tiempo de tratamiento son de acuerdo al criterio del médico veterinario.
Periodo de Retiro:
El consumo de carne de las aves tratadas deberá esperar, por lo menos, 5 días posteriores a la última administración. En pollas de reemplazo, se deberá suspender el uso del producto 3 semanas antes de postura.
Presentación:
10 kg.
USO VETERINARIO



NFL-MAX® CON EXPECTORANTE
Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-125

Fórmula:
Cada 100 g contienen:

Florfenicol	4 g
Tartrato de Tilosina	11 g
Clorhidrato de Ambroxol	0.4 g
Excipiente cbp	100 g

Indicaciones:
NFL-MAX® CON EXPECTORANTE premezcla diseñada para el control de las infecciones. Su acción se encuentra reforzada por la adición de un agente expectorante: el Ambroxol. Se usa en enfermedades respiratorias de aves de combate, polla de reemplazo, pollo de engorda.
NFL-MAX® CON EXPECTORANTE ofrece un control eficiente de infecciones por *Streptococcus spp., Haemophilus paragallinarum, Mycoplasma synoviae, Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma spp., Pasteurella spp., Staphylococcus aureus.*
NFL-MAX® CON EXPECTORANTE es un antibiótico que previene la mortalidad y daño pulmonar cuando se aplica en medicaciones estratégicas, o bien cuando la infección sea grave, teniendo la seguridad de que sus antibióticos están actuando eficientemente casi de inmediato después del consumo del alimento medicado.
Vía de administración:
Oral, mezclado con el alimento.
Dosis:
En aves de combate, polla de reemplazo, pollo de engorda se recomienda usar 2 kg/ton de alimento durante 5 a 10 días.
Periodo de Retiro:
El consumo de carne de las aves tratadas deberá esperar, por lo menos, 13 días posteriores a la última administración. En pollas de reemplazo, se deberá suspender el uso del producto 3 semanas antes de postura. No administrar en gallinas reproductoras o ponedoras en producción de huevo para consumo humano.
Presentación:
5 kg y 25 kg.
USO VETERINARIO



ADITIVOS PARA EL ALIMENTO PREMEZCLA



PISACOX®
Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-195

Fórmula:
Cada 1000 g contienen:
Salinomicina sódica 12 g
Excipiente cbp 100 g
Indicaciones:
PISACOX®: Para la prevención de coccidias en aves: pollo de engorda y pollitas de reemplazo *(E. acervulina, E. máxima, E. tenella, E. mitis, E. necatrix, E. praecox* y *E. brunetti).*
Vía de administración:
Oral, mezclado con el alimento.
Dosis:
Pollos y pollitas de reemplazo menores a las 14 semanas de edad:
Mezclar perfectamente 500 g de PISACOX® por tonelada de alimento (60 ppm de Salinomicina). Administrar desde el primer día de edad.
Periodo de Retiro:
Suspender su administración a los animales destinados al consumo humano 5 días antes del sacrificio.
No administrar en gallinas reproductoras o ponedoras en producción de huevo incubable o para consumo humano.
Presentación:
25 kg.
USO VETERIANARIO



SEBENDAZOL® 4%
Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-072

Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Fenbendazol 4 g
Excipiente cbp 100 g
Indicaciones:
SEBENDAZOL® 4% actúa contra los parásitos frecuentes que afectan a las aves de engorda tales como: *Ascaridia spp., Heterakis spp., Capillaria spp., Raillietina spp.* y *Syngamus trachea.*
SEBENDAZOL® 4% es efectivo contra los parásitos adultos e inclusive actúa en las fases juveniles (larvas).
Vía de administración:
Oral, mezclado en el alimento.
Dosis:
Aves de engorda:
1.5 kg de SEBENDAZOL® 4% por tonelada de alimento durante 3 días consecutivos (60 ppm de Fenbendazol).
750 g de SEBENDAZOL® 4% por tonelada de alimento durante 5 días consecutivos (30 ppm de Fenbendazol).
Periodo de Retiro:
El consumo de la carne de las aves tratadas deberá esperar, por lo menos, 15 días posteriores a la última administración. No administrar en gallinas reproductoras o ponedoras en producción de huevo incubable o para consumo humano.
Presentación:
25 kg.
USO VETERINARIO

ANTIMICROBIANOS



3 SULFAS® INYECTABLE
Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-006

Fórmula:
Cada 100 mL contienen:
Sulfametazina 6.66 g
Sulfamerazina 6.66 g
Sulfadiazina 6.66 g
Vehículo cbp 100 mL
Indicaciones:
3 SULFAS® INYECTABLE: Se indica para el tratamiento de aves (pollo de engorda, pollita de reemplazo, gallina de postura, gallina reproductora) por infecciones causadas por bacterias sensibles a la fórmula.
Vía de administración:
Intravenosa, intramuscular o en el agua de bebida.
Dosis: Véase instructivo anexo.
Periodo de Retiro:
El sacrificio al consumo humano debe esperar, por lo menos, 5 días posteriores a la última administración del producto.
Presentación:
Un frasco con 100 mL, 250 mL y 500 mL.
USO VETERINARIO



A.M.X.® 50% Soluble
Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-127

Fórmula:
Cada 100 g contienen:
Amoxicilina trihidratada 50 g
Excipiente cbp 100 g
Indicaciones:
Para el control y tratamiento de enfermedades causadas por bacterias sensibles a la Amoxicilina; *Avibacterium paragallinarum, Escherichia coli, Salmonella spp., Clostridum spp. Staphilococcos spp., Ornithobacterium rhinotracheale.*
A.M.X.® 50% Soluble: Se usa para la prevención y tratamiento de enfermedades, causadas por gérmenes sensibles a la Amoxicilina; se usa contra: sinusitis, coriza, artritis, colibacilosis, salmonelosis, clostridiasis, nefritis, estafilococosis y ORT *(Ornithobacterium rhinotracheale).*
Vía de administración:
Oral, en el agua de bebida.
Dosis:
La dosis recomendada de Amoxicilina es de 10 a 20 mg/kg de peso durante 3 a 5 días. Esta dosis se obtiene normalmente al agregar 20 a 30 g de A.M.X.® 50% Soluble por cada 200 litros de agua de bebida.
Periodo de Retiro:
Para carne, leche y huevo son 14 días después de haber terminado el tratamiento.
Presentación:
500 g.
USO VETERINARIO



ACTYNOCEF®
Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-084

Fórmula:
Cada frasco contiene:
Ceftriaxona disódica
Equivalente a 4 g
De Ceftriaxona base
Indicaciones:
Para el control y tratamiento de enfermedades: coriza infecciosa, cólera aviar, salmonelosis, clostridiasis y colibacilosis en pollos de un día de edad.
Actynocef ® no modifica los titulos vacunales del virus de Marek.
Vía de administración:
Subcutánea y/o intramuscular.
Dosis:
2 a 4 mg/kg de peso corporal.
ACTYNOCEF® debe ser reconstituido agregando al frasco ámpula 100 ml de agua bidestilada estéril. Cada mL de la solución resultante tendrá 40 mg de Ceftriaxona.
Presentación:
12 frascos de 4 g c/u
USO VETERINARIO



ACTYNOXEL® RTU
Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-112

Fórmula:
Cada 100 ml contienen:
Clorhidrato de Ceftiofur 5 g
Vehículo cbp 100 mL
Indicaciones:
Se indica en aves de combate, pollo de engorde, polla de remplazo y gallinas reproductoras, para el control y tratamiento de enfermedades causadas por bacterias susceptibles al Ceftiofur *(Pasteurella spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Salmonella spp., E. coli).*
Vía de administración:
Subcutánea.
Dosis:
2 mg por kg de peso, cada 24 horas por un periodo de 3 días; dependiendo de la severidad del cuadro clínico, puede administrarse durante 5 días.
Tiempo de Retiro:
21 días en carne de pollo.
Presentación:
Frasco con 100 mL y 250 mL.
USO VETERINARIO





ANTIMICROBIANOS



FOSFODICA®
Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-140

Fórmula:
Cada 100 mL contienen:
Fosfomicina disódica 10 g
Vehículo c.b.p. 100 ml
Indicaciones:
FOSFODICA® se indica para el control y tratamiento de enfermedades bacterianas que afectan a las aves, causadas por bacterias *(Avibacterium paragallinarum, E. coli, Salmonella spp., Pasteurella spp.,* entre otras) sensibles a la Fosfomicina.
Vía de administración:
Oral, en el agua de bebida.
Dosis:
10 a 20 mg/kg de peso corporal, durante 3 a 5 días.
Periodo de retiro:
La carne y huevo de los animales tratados no deberán consumirse hasta 5 días después del último tratamiento.
Presentación:
1 y 20L.
USO VETERINARIO





GENTAERBA® SOLUBLE
Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-007

Fórmula:
Cada g contiene:
Sulfato de Gentamicina equivalente a de Gentamicina 66.7 mg
Excipiente cbp 1 g
Indicaciones:
GENTAERBA® SOLUBLE se indica para el control y tratamiento de infecciones causadas por bacterias susceptibles a la Gentamicina.
Vía de administración:
Oral, en el agua de bebida.
Dosis:
Para la dosificación en el agua de bebida, disuelva 1 sobre de **GENTAERBA® SOLUBLE** en 50 litros de agua durante 5 días, aun cuando los signos de enfermedad hayan desaparecido antes de ese término.
Ajuste la dosificación en caso de que existan variaciones importantes en el consumo de agua, asegurar la dosis de 4 a 5 mg por cada kg de peso corporal.
Periodo de retiro:
El consumo de la carne de los animales tratados deberá esperar, por lo menos, 10 días posteriores a la última administración.
Presentación:
20 sobres de 10 g c/u
USO VETERINARIO





PIROFLOX®
Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-033

Fórmula:
Cada 100 mL contiene:
Enrofloxacina 10 g
Vehículo cbp 100 mL
Indicaciones:
Bactericida y micoplasmicida de amplio espectro indicado para el tratamiento de las enfermedades respiratorias y digestivas de las aves (pollos de engorda), causadas por gérmenes Gram negativos, Gram positivos y Micoplasmas, ejemplo: *Escherichia coli, Enterobacter spp., Klebsiella spp., Proteus spp., y Corynebacterium spp., Salmonella spp., Pseudomona aeruginosa, Haemophylus spp., Pasteurella multocida, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,* y *Mycoplasma spp.*
Vía de administración:
Oral.
Dosis:
En el agua de bebida en aves:
Dosis por peso: Administrar 5-10 mg/kg de peso corporal.
Dosis por volumen de agua de bebida:(Administrar 1.0 mL de Piroflox® por cada 2 litros de agua).
Periodo de retiro:
El sacrificio de las aves destinadas para consumo humano debe esperar, por lo menos, 5 días posteriores a su última administración.
Presentación:
Frasco con 250 mL.
USO VETERINARIO





GENTAERBA® INYECTABLE
Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-004

Fórmula:
Cada 100 mL contienen:
Sulfato de Gentamicina equivalente a de Gentamicina 10 g
Vehículo cbp 100 ml
Indicaciones:
GENTAERBA® INYECTABLE se indica para el control y tratamiento de enfermedades causadas por bacterias sensibles a la gentamicina *(E. coli, Pasteurella aeruginosa, Arizona paracolon, Salmonella spp.).*
Dosis:
2-4 mg por kilogramo de peso corporal.
Vía de administración:
Subcutánea o Intramuscular.
Periodo de retiro:
La carne de los animales tratados no deberá consumirse hasta 5 semanas después del último tratamiento.
Presentación:
Frasco con 100 mL.
USO VETERINARIO





NF-180® NFL
Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-129

Fórmula:
Cada 100 mL contiene:
Florfenicol 10 g
Vehículo cbp 100 ml
Indicaciones:
NF-180® NFL, Solución Oral al 10%, se indica en el tratamiento de bacterias y enfermedades infecciosas de las aves (pollo de engorda, polla de reemplazo, gallinas de postura, gallina reproductora) causadas por Gram positivas y Gram negativas.
Gram-positivas: *Corynebacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Clostridium spp.*
Gram-negativas: *E.coli, Pasteurella haemolítica, Pasteurella multocida, Avibacterium paragallinarum.*
Vía de administración:
Oral, en el agua de bebida.
Dosis:
En aves la dosis 20 mg/kg de peso corporal, (dos litros medican 10,000 kg de peso vivo).
Periodo de retiro:
El consumo de aves tratadas deberá esperar, por lo menos, 48 horas posteriores a la última administración. No administrar en gallinas reproductoras o ponedoras en producción de huevo incubable o para consumo humano.
Presentación:
2 L.
USO VETERINARIO





PIROFLOX® PLUS
Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-186

Fórmula:
Cada 100 mL contienen:
Enrofloxacina 10 g
Bromhexina 0.5 g
Vehículo cbp 100 mL
Indicaciones:
Piroflox® Plus es un producto que combina un antimicrobiano de amplio espectro la Enrofloxacina con el efecto mucolítico y expectorante de la Bromhexina. Está indicado para el tratamiento en las enfermedades respiratorias, causadas por: *Bacteroides spp., Campylobacter spp., E. Coli, Clostridium perfringens, Klebsiella spp., Avibacterium paragallinarum, Pasteurella spp., Salmonella spp., Proteus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium pyogenes, Pseudomona aeruginosa,* y *Mycoplasma spp.*
Vía de administración:
Intramuscular.
Dosis:
En aves: 10 a 20 mg por kilogramo de peso corporal, cada 24 horas por un periodo de 3 a 5 días.
Presentación:
Frasco con 250 mL.
USO VETERINARIO









PIROFLOX® 20%

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-090

Fórmula:
Cada 100 mL contienen:

Enrofloxacina	20 g
Vehículo cbp	100 mL

Indicaciones:
Por su rápida absorción y elevada concentración plasmática, Piroflox® 20% Solución Oral Concentrada está indicado para el tratamiento de enfermedades infecciosas de las aves (pollo de engorde, pollita de reemplazo, gallina ponedora, gallina reproductora) causadas por gérmenes Gram negativos, Gram positivos y mycoplasmas, ejemplo: *Escherichia coli, Haemophilus spp., Pasteurella multocida, Salmonella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp., Pseudomona aeruginosa* y *Mycoplasma spp.*
Vía de administración:
Oral, en el agua de bebida.
Dosis:
Administrar 10 mg/kg de peso corporal (1 mL de Piroflox® 20% Solución Oral Concentrada por cada 20 kg de peso)
Formas de tratamiento:
Tratamiento por administración continua: Diluir el volumen necesario de Piroflox® 20% Solución Oral en el volumen adecuado de agua de bebida y ofrecer en forma continua el agua medicada a las aves por el tiempo necesario.
Tratamiento por peso: 1) Calcular la cantidad de **Piroflox® 20%** Solución Oral Concentrada necesaria, para el total de kilos de aves a tratar; 2) Calcular la cantidad de agua consumida diariamente por las aves a tratar; 3) Diluir todo el volumen de medicamento en 1/4 del volumen de agua de bebida consumida diariamente por el lote; 4) Esperar a que los animales se consuman el total del agua medicada;
5) Durante el resto del día administrar el agua sin medicar.
Periodo de retiro:
El huevo proveniente de aves tratadas no podrá destinarse para consumo humano hasta 6 días después del último tratamiento. El consumo de la carne de las aves tratadas deberá esperar, 5 días posteriores a la última administración.
Presentación:
1 L ,5 L y 20 L
USO VETERINARIO



PISAMIX® PLUS

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-093

Fórmula:
Cada 100 g contienen:

Sulfacloropiridazina sódica	10 g
Trimetoprim	2 g
Excipiente cbp	100 g

Indicaciones:
PISAMIX® PLUS está indicado para la control y tratamiento de infecciones provocadas por bacterias Gram positivas *(Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium perfringens)* y Gram negativas *(E. coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., Haemophillus spp.)* e infecciones ocasionadas por algunos protozoarios *(Coccidia).*
PISAMIX® PLUS está indicado en aves (pollo de engorda, polla de reemplazo y reproductoras, aves de combate).
Vía de administración:
Oral, mezclado en el alimento o agua de bebida.
Dosis:
200 mg **PISAMIX® PLUS** equivalente a 24 mg de (Sulfacloropiridazina Trimetoprim) por kg de peso corporal al día.
En aves de combate, pollo de engorda, polla de reemplazo y reproductoras, se recomienda un periodo de 3 a 6 días pero en el caso de complicaciones con 2 o más especies bacterianas, se puede prolongar el tratamiento hasta 10 a 14 días, dependiendo del criterio del Médico Veterinario.
Periodo de retiro:
El consumo de carne de las aves tratadas deberá esperar, por lo menos, 5 días posteriores a la última administración. En pollas de reemplazo, se deberá suspender el uso del producto 3 semanas antes del inicio de postura.
Presentación:
5 kg.
USO VETERINARIO



PIROFLOX® PLUS 10%

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-094

Fórmula:
Cada 100 mL. contienen:

Enrofloxacina	10 g
Bromhexina	1.1 g
Vehículo cbp	100 ml

Indicaciones:
Piroflox® plus 10% Solución Oral es un producto que combina el amplio espectro de acción de la Enrofloxacina con el efecto mucolítico expectorante de la Bromhexina y está especialmente indicado para el tratamiento de las enfermedades respiratorias de las aves: pollo de engorde, pollita de reemplazo, gallina de postura, gallina reproductora, causadas por gérmenes Gram negativos, Gram positivos y mycoplasmas, como: *Escherichia coli, Haemophilus spp., Pasteurella multocida, Salmonella spp. y Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp., Pseudomona aeruginosa y Mycoplasma spp.*
Vía de administración:
Oral, en el agua de bebida.
Dosis:
Dosis por peso: Administrar 10 mg/kg de peso vivo (1 a 1.5 mL de Piroflox® Plus 10% Solución Oral por cada 10 kg de peso).
Periodo de retiro:
El huevo proveniente de aves tratadas no podrá destinarse para consumo humano hasta 6 días después del último tratamiento. El consumo de la carne de las aves tratadas deberá esperar, por lo menos, 5 días posteriores a la última administración.
Presentación:
5 L.
USO VETERINARIO



VALSYN® NF

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-157

Fórmula:
Cada 100 g contienen:

Doxiciclina	15 g
Clorhidrato de Ambroxol	0.6 g
Excipiente cbp	100 g

Indicaciones:
Valsyn® NF es la combinación de un antibiótico de amplio espectro (Doxiciclina) y un mucolítico expectorante (Ambroxol) indicado en aves (gallinas reproductoras, pollo de engorde, pollas de reemplazo, pavos, aves de combate) como terapia de enfermedades causadas por microorganismos sensibles a la Doxiciclina.
En aves: para controlar las infecciones bacterianas del tracto respiratorio, como son la enfermedad respiratoria crónica complicada por *Mycoplasma spp.* y *Escherichia coli* (Aerosaculitis) de infecciones por *Salmonella spp.*
Vía de Administración:
Oral, en el agua de bebida.
Dosis:
De 15 mg/kg de peso (1000 g Valsyn® NF por cada 1000 litros de agua). Dicha dosis debe ser administrada por un periodo de 5 días.
Periodo de retiro:
El consumo de carne de las aves tratadas deberá esperar 7 días antes del sacrificio. No administrar en gallinas reproductoras o ponedoras en producción de huevo incubable o para consumo humano.
Presentación:
100 sobres de 5 g c/u
Cubeta 10 kg.
USO VETERINARIO



ANTIPARASITARIOS



COCCITRAK®
Reg. S.A.G.A.R.P.A.Q-7833-160

Fórmula:
Cada mL contiene:
Toltrazuril 25 mg
Excipiente cbp 1 mL
Indicaciones:
COCCITRAK® es un coccidicida efectivo contra todas las especies del genero Eimeria que afectan a las aves (pollo de engorde, pavos, aves de combate, palomas mensajeras, polla de reemplazo, gallina ponedora, gallina reproductora), actuando incluso en aquellas resistentes a otros compuestos
COCCITRAK® actúa contra todos los estadíos intracelulares del parásito como son: esquisontes generación I, II y III, así como contra los oocistos.
Pollos: *E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis, E. necatrix* y *E. tenella.*
Pavos: *E. adenoides* y *E. meleagrimitis.*
Vía de administración:
Oral en el agua de bebida.
Dosis:
La dosificación general de rutina en aves corresponde a 1 L de **COCCITRAK®** por 1000 L de agua de bebida (25 ppm) durante 2 días continuos.
Esta dosis equivale con los consumos de agua promedio a 7 mg/kg de peso corporal.
Periodo de Retiro:
Los huevos y la carne provenientes de aves tratadas no podrán destinarse para consumo humano hasta 5 días después del último tratamiento.
Presentación:
Frasco con 1 L.
USO VETERINARIO



ECTOSIN®
Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-130

Fórmula:
Cada 100 mL contienen:
Ivermectina 1 g
Vehículo cbp 100 ml
Indicaciones:
ECTOSIN® es un desparasitante oral indicado para el tratamiento y control de nematodos gastrointestinales y ectoparásitos (piojos y ácaros) de aves (gallinas reproductoras, de postura, pollos de engorda, aves de combate y palomas mensajeras), tales como:
Nemátodos gastrointestinales:
Ascaridia galli y *Capillaria spp.*
Ectoparásitos:
Demanyssus gallinae, Ornythonissus bursa, Ornythonissus sylviarum, Menopon gallinae, Lipeurus spp. y Menacanthus stramineus.
Vía de administración:
Oral, disuelto en el agua de bebida (un litro de solución medica 25,000 kg de peso vivo en aves).
Dosis:
Parásitos internos: La dosis es de 400 µg por kilogramo de peso por 2 días, y en caso necesario, repetir el tratamiento a los 15 días.
Ectoparásitos; reproductoras y de postura, se administra en el agua de bebida a razón de 400 µg por kilogramo de peso durante 3 a 5 días y se repite el tratamiento a los 10 a 15 días si es necesario.
Periodo de Retiro:
El sacrificio de pollos de engorda destinados al consumo humano debe esperar por lo menos 10 días posteriores a la última administración del producto.
Presenta cero días de retiro en huevo (ponedoras ligeras).
Presentación:
Frasco con 1 L.
USO VETERINARIO



FENPIZOL®
Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-021

Fórmula:
Cada g contiene:
Fenbendazol 0.04 g
Excipiente cbp 1 g
Indicaciones:
FENPIZOL®: Antiparasitario para aves (reproductoras, gallinas de postura, pollos de engorde y aves de combate). Es efectivo contra *Capillaria spp., Ascaridia spp., Syngamus, Amidostomum anseris, Heterakis gallinarum* y *Raillietina spp.*
Vía de administración:
Oral, mezclado en el alimento.
Dosis:
Administrar un sobre por cada 50 aves por día, durante 4 días consecutivos.
Presentación:
50 sobres de 12.5 g c/u
USO VETERINARIO

ESTIMULANTES DE APETITO Y HEMATOPOYÉTICOS



CAROSEN® C

Fórmula:
Cada 200 g contienen:

Vitamina A	5'000,000 UI
Vitamina D3	500,000 UI
Vitamina E	5,000 UI
Vitamina B1	0.750 g
Vitamina B2	2.000 g
Vitamina B6	1.750 g
Vitamina B12	0.005 g
Vitamina K3	5.000 g
Nicotinamida	12.500 g
Pantotenato de Calcio	6.750 g
Ácido Fólico	0.400 g
Biotina	0.020 g
Vitamina C	125.000 g
Excipiente cbp	200 g

Indicaciones:
Multivitamínico concentrado hidrosoluble, adicionado con vitamina C, para utilizarse en aves (pollo de engorda, reproductoras gallinas de postura y aves de combate) en estado de tensión o enfermedad, o bien como complemento para su óptimo rendimiento productivo, además mejora la respuesta inmunitaria y reduce los efectos negativos por el estrés calórico.
Vía de administración:
Oral, disuelto en el agua de bebida.
Dosis:
Administrar 200 g de **Carosen® C** por cada 1,000 litros de agua de bebida en animales sujetos a tensión o enfermedad por un periodo de 5 a 7 días.
Recomendaciones:
En aves se usa durante la primera semana de vida a la mitad del ciclo de engorda y/o crianza y al inicio de la producción de huevo por un periodo de 5 a 7 días. En el tratamiento de enteritis hemorrágicas (coccidiosis) y en casos donde se presente fragilidad del cascarón, así como en casos de intoxicación de origen alimentario (micotoxinas).
Presentación:
Cubeta con 25 sobres de 200 g c/u
USO VETERINARIO



CAROSEN® CONCENTRADO

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-082



Fórmula:
Cada 100 g contienen:

Vitamina A	5'000,000 UI
Vitamina D-3	500,000 UI
Vitamina E	5,000 UI
Vitamina B-1	0.750 g
Vitamina B-2	2.000 g
Vitamina B-6	1.750 g
Vitamina B-12 (Cianocobalamina)	0.005 g
Nicotinamida	12.500 g
D-Pantotenato de calcio	6.750 g
Vitamina K	2.000 g
Excipiente cbp	100 g

Indicaciones:
CAROSEN® CONCENTRADO es un multivitamínico indispensable en las aves, está formulado para corregir las deficiencias de las vitaminas que intervienen en el metabolismo energético intermedio y en la respuesta inmune de las aves (reproductoras, gallinas de postura, pollo de engorda, aves de combate y palomas mensajeras) que se presentan durante los periodos de estrés, enfermedad y/o convalecencia; acortando así los periodos de recuperación. **Carosen® CONCENTRADO** facilita el tratamiento colectivo y asegura la medicación de aquellos animales que pierden el apetito pero no la sed. También actúa como coadyuvante para lograr un óptimo crecimiento y productividad.
Vía de administración:
Oral disuelto en agua de bebida o mezclado con el alimento.
Dosis:
Para reducir los efectos de estrés y enfermedad:
Aves: administrar 1 g de **CAROSEN® CONCENTRADO** por cada 10 L de agua durante 7 a 10 días o hasta que se normalice el consumo de alimento.
Para un óptimo crecimiento y productividad:
Aves: administrar 1 g de **CAROSEN® CONCENTRADO** por cada 20 L de agua.
Presentación:
20 sobres con 50 g c/u
USO VETERINARIO

COMPLENAY® B12

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-056



Fórmula:
Cada 100 ml contienen:

Sulfato de Mefentermina	67 mg
Fosfato sódico de Riboflavina	14 mg
Clorhidrato de Piridoxina	10 mg
Clorhidrato de Tiamina	70 mg
Cianocobalamina	67 µg
Nicotinamida	140 mg
Glicerofosfato de sodio	720 mg
Glicerofosfato de potasio	100 mg
Glicerofosfato de calcio	500 mg
Glicerofosfato de manganeso	50 mg
Saborizantes y vehículo cbp	100 ml

Indicaciones:
Complenay® B12 Elíxir, es un concentrado multivitamínico indicado para estimular a animales de alto rendimiento en sus diferentes etapas de desarrollo, lo cual se refleja en una mejor respuesta al medio ambiente, mejor ganancia de peso, fuerza y resistencia. Fortifica a animales enfermos y/o convalecientes y proporciona tiempos de recuperación más cortos. Útil para contrarrestar los efectos adversos del estrés por sobre la productividad animal o trabajo.
Vía de administración:
Oral, en el agua de bebida.
Dosis:
Aves (pollo de engorde, reproductoras, aves de combate y palomas mensajeras): en el agua de bebida, 15 mL por cada 2 litros de agua por 3 a 5 días; las aves deberán beber exclusivamente el agua medicada.
Presentación:
3.5 L.
100 mL.
USO VETERINARIO

COMPLENAY® B12 POLVO

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-057



Fórmula:
Cada 100 g contienen:

Sulfato de Mefentermina	0.5 g
Clorhidrato de Tiamina	0.5 g
Riboflavina 5 fosfato	0.1 g
Clorhidrato de Piridoxina	0.070 g
Cianocobalamina	0.500 mg
Nicotinamida	1.0 g
Glicerofosfato de calcio	3.5 g
Glicerofosfato de sodio	7.0 g
Glicerofosfato de manganeso	0.350 g
Cloruro de potasio	0.420 g
Excipiente cbp	100 g

Indicaciones:
Complenay® B12 es un polvo soluble que ayuda a la recuperación y mejora el estado general de las aves (pollo de engorda, gallinas de postura, reproductoras y aves de combate) por sus efectos estimulantes y reconstituyentes.
Es útil en las aves convalecientes por enfermedad, reduce el tiempo de recuperacion, mejora la hematopoyesis. Reduce los efectos improductivos por factores de estrés. Mejora el estado fisico de los animales durante las etapa de crianza y engorde.
Vía de administración:
Oral, en el agua de bebida.
Dosis:
1 g por cada litro de agua de bebida. Los animales deberán beber exclusivamente el agua medicada por un periodo de 3 a 5 días.
Presentación:
2 kg.
USO VETERINARIO

VITABECID®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-203



Fórmula:
Cada mL contiene:

Butafosfán	100 mg
Vitamina B-12	0.05 mg
Vehículo cbp	1 mL

Indicaciones:
VITABECID®: Está indicado en aves (reproductoras, machos reproductores y gallos de pelea), como reconstituyente general en casos de estrés, ejercicio excesivo, cansancio, resistencia reducida y como un tónico en casos de debilidad y anemia secundaria; apoya adicionalmente la fisiología del músculo, el tratamiento de la infertilidad, como un adjunto a la terapia con calcio y magnesio. En el tratamiento de animales sanos se usa para mejorar el estado general de los animales.
Vía de administración:
Subcutánea, intramuscular o endovenosa.
Dosis:
0.5-1 ml por ave. Repita diariamente si se requiere.
En animales sanos la mitad de la dosis y en caso necesario, repetirla con intervalos de 1 a 2 semanas.
Presentación
Frasco con 100 mL.
USO VETERINARIO



TERAPIA APARATO DIGESTIVO



NF 180® N.F.

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-115

Fórmula:
Cada tableta contiene:

Norfloxacina	40 mg
Excipiente cbp	1 tableta

Indicaciones:
Fluorquinolona de amplio espectro y acción, ejerciendo un efecto bactericida; indicado en el tratamiento, prevención y control de infecciones bacterianas e infecciones causadas por *Salmonella spp., Pasteurella multocida, Haemophilus spp., Mycoplasma spp.,* y *Escherichia coli.*
Su gran capacidad de difusión celular permite tratar infecciones intracelulares como micoplasmosis y salmonelosis.
Vía de administración:
Oral.
Dosis:
20 mg/kg de peso (1/2 tableta por kg de peso) con intervalos de dosificación de 24 horas durante 5 a 7 días.
Periodo de retiro:
El consumo de carne de las aves tratadas deberá esperar, por lo menos, 12 días posteriores a la última administración.
Presentación:
Caja con 600 tabletas.
USO VETERINARIO

PREPARADOS DE USO EXTERNO



FURACINE® NF

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-201

Fórmula:
Cada 100 g contienen:

Florfenicol	0.6 g
Vehículo cbp	100 g

Indicaciones:
FURACINE® NF: Está indicado para la prevencion y control de infecciones superficiales de la piel, como heridas, quemaduras y úlceras cutáneas causadas por bacterias Gram positivas y Gram negativas sensibles a la accion del Florfenicol.
Vía de administración:
Tópica.
Dosis:
Una vez al día por 3 a 5 días, lo cual puede ser modificado a criterio del Médico Veterinario.
Presentación:
Tarro 453 g.
Tubo con 85 g.
USO VETERINARIO

SOLUCIONES Y ELECTROLITOS



ELECTRODEX®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-121

Fórmula:
Cada 1,000 g contienen:

Ácido Ascórbico	50 g
Ácido Acetoxibenzoico (Ácido Acetilsalicílico)	62.5 g
Cloruro de sodio	128 g
Cloruro de potasio	28 g
Excipiente cbp	1,000 g

Indicaciones:
ELECTRODEX®: se indica para aves (reproductoras, gallina de postura, pollo de engorda, pavos, aves de combate).
•Para el restablecimiento de los animales después de haber estado expuestos a deshidratación y estrés por: manejo, transporte, recepción en instalaciones, despique, vacunaciones, cambios bruscos de temperatura y todos aquellos factores estresantes que desencadenen dicho proceso.
•En la prevención de estrés al realizar todos aquellos manejos que pueden ser considerados como factores estresantes como los ya enunciados.
•Así como para el restablecimiento del equilibrio hidrolítico en esta especie.
Vía de administración:
Oral, disuelto en el agua de bebida.
Dosis:
Aves: 1 g/1-2 litros de agua.
Presentación:
Cubeta con 10 kg.
USO VETERINARIO



CONTROL DE VECTORES



SINATAQ®

Insecticida y/o acaricida concentrado emulsionable.
RSCO-URB-INAC-111-14-009-21.12

Fórmula:

Cipermetrina	21.12 %
Butóxido de Piperonilo	7 %
Vehículo cbp	100 %

Descripción:
Insecticida de amplio espectro de actividad.
Puede usarse dentro y alrededor de todo tipo de instalaciones y estructuras.
Uso:
Insectos voladores y rastreros.
Dosis:
5 a 10 ml/litro de agua, según el nivel de infestación.
Forma de aplicación:
Aspersión, termonebulización y nebulización.
Presentaciones:
Envase plástico 1 L.
Envase plástico 100 mL.



ZIROLARV®

Larvicida en polvo soluble.
REG. RSCO -PEC-INAC-0173-314-003-053

Fórmula:

Ciromazina	52.5 %
Antiapelmazante y vehículo	47.5 %

Descripción:
Zirolarv® es un larvicida hecho a base de Ciromazina altamente efectivo para controlar larvas de todo tipo de moscas y mosquitos, altamente seguro para porcinos, bovinos y aves. Evita el desarrollo de las larvas de moscas que afectan en la producción animal como: Mosca doméstica *(Musca domestica)*, Mosca del cuerno *(Haematobia irritans)*, Mosca de establo *(Stomoxys calcitrans)*, Pequeña mosca domestica *(Fannia canicularis)*.
Uso:
Pecuario.
Dosis:
80 g por cada 20-60 litros de agua para tratar 80 m^2 de estiércol y/o superficie con población de larvas.
Forma de aplicación:
Aspersión y riego.
Presentaciones:
Tarro con 250 g.



FIST® GEL

Cucarachicida cebo en gel.
RSCO-DOM-INAC-174-309-092-0.050

Fórmula:

Abamectina	0.05 %
Vehículo cbp	99.95 %

Descripción:
Cucarachicida formulado como cebo en gel.
Excelente efecto residual que contiene potentes atrayentes específicos. Es fácil de aplicar pues se adapta a cualquier tipo de superficie y no se endurece como otros en el mercado.
Uso:
Todo tipo de instalación.
Dosis:
Aplique un punto de gel en grietas o hendiduras donde se observe rastros y/o evidencia de cucarachas.
Presentaciones:
Jeringa con 30 g.



CONTROL DE VECTORES



TOTENFLI®
Mosquicida en cebo granulado.
RSCO-PEC-INAC-0199-381-420-001

Fórmula:

Imidacloprid	1.0%
Z-9 Tricosene	

Descripción:
Polvo humectable insecticida granulado con ingredientes de primera calidad, los cuales dan un excelente resultado en el control de moscas con aparato bucal esponjoso chupador *(ej. Musca domestica)* puede ser utilizado en cualquier tipo de instalación pecuaria.
Forma de aplicación:
-Esparcido (voleo).
-Con brocha (pintado).
-Aspersión.
-Sobre recipientes o adherido.
Dosis:
1 mg/m^2
Presentaciones:
Tarro de 1 kg.
Tarro de 2 kg.



SINATAQ® 40
Insecticida y/o acaricida polvo humectable.
RSCO-URB-INAC-111-306-002-40

Fórmula:

Cipermetrina Hi-CIS (80-20)	40 %
Dispersante, humectante y portadores	40 %
Butoxido de Piperonilo	10 %
N-Octyl (MGK 264)	10 %

Descripción:
Polvo humectable insecticida y acaricida de última generación, su nueva fórmula cuenta con un excelente poder residual debido a su formulación como polvo humectable que no tiene olor, no mancha, ni tapa boquillas. Es ideal para trabajar en áreas con problemas de resistencia, ya que está doblemente sinergizado.
Uso:
Insectos voladores y rastreros.
Forma de aplicación:
Se aplica con cualquier equipo profesional para fumigar.
Presentaciones:
-Exhibidor con 25 sobres con 10 g c/u
-Tarro con 250 g.



DIAMAL®
Rodenticida en cereal.
RSCO-URB-RODE-511-351-005-0.005

Fórmula:

Bromadiolona	0.005%
Ingredientes inertes	99.995%

Descripción:
Rodenticida en cereal que actúa en una sola ingesta a base de un anticoagulante de segunda generación (Bromadiolona) para el control de ratas y ratones, altamente palatable.
Uso:
Todo tipo de instalación.
Dosis:
Rata noruega y de tejado 50 a 150 g cada 5 metros.
Ratón doméstico 25 g cada 3 a 4 metros.
Presentaciones:
Cereal: cubeta con 5 kg y costal con 25 kg.



DIAMAL®
Rodenticida parafinado.
RSCO-URB-RODE-511-339-033-0.005

Fórmula:

Bromadiolona	0.005 %
Ingredientes Inertes	99.995 %

Descripción:
Rodenticida formulado con un anticoagulante de segunda generación, que al ser consumido por el roedor con una sola dosis, será suficiente para conseguir una dosis letal.
Uso:
Sitios urbanos, instalaciones pecuarias o industriales.
Administración:
Personal.
Dosis:
Rata noruega y de tejado 5 a 10 bloques en distancias de 5 a 10 metros.
Ratón doméstico 2 a 4 bloques en distancias de 3 a 4 metros.
Presentaciones:
Cubeta con 5 kg con bloques de 10 g c/u

DETERGENTES



DETEX®
Detergente alcalino líquido desengrasante.

Fórmula:	% en peso
Hidróxido de sodio	13
Agentes limpiadores anfotéricos	11
Agentes secuestrantes	18
Tensoactivos no iónicos	16
Vehículo	cbp

Descripción:
DETEX® es un detergente alcalino líquido, ideal para desengrasar instalaciones y equipos de uso pecuario. Apoya la fácil remoción de materia orgánica y grasa. Puede ser utilizado con cualquier equipo, herramienta e instalaciones de producción animal: incubadoras, becerras, maternidades, corrales porcinos y/o bovinos, rastros, clínicas veterinarias, hospitales, etc.
Uso: Todo tipo de instalación.
Forma de aplicación:
Mochila de aspersión, hidrolavadora con lanza de aplicación o pistola espumadora (preferentemente) a media presión.
Dosis:
Aplicación en asperción 10 a 20 mL/L de agua, lo cual proporciona un rendimiento de 400 mL/ m^2
Aplicación en pistola espumadora de 10 a 20 mL/L de agua, lo cual proporciona un rendimiento de 200 mL/m^2
Presentaciones:
Porrón de 25 L.

DESINFECTANTES



TH4+®
Desinfección total solución.
Reg. S.A.G.A.R.P.A.Q-7833-118

Fórmula:	
-Didecil dimetil amonio	18.75 g
-Alquil dimetil benzil cloruro de amonio	50.00 g
-Octil dicildimetil cloruro de amonio	37.50 g
-Dioctil dimetil cloruro de amonio	18.75 g
-Glutaraldehído	62.50 g
-Aceite de pino	20.00 g
-Terpineol	20.00 g
Vehículo cbp	1000 mL

Descripción:
Desinfectante de amplio espectro de acción; es una mezcla sinergística de Glutaraldehído y 4 compuestos de Amonio Cuaternario que forman una 5ta generación. Eficacia comprobada en instalaciones, material orgánico y aguas duras. Elimina gérmenes patógenos como bacterias, virus, levadura y hongos.
Uso:
Todo tipo de instalación.
Dosis:
5 a 20 mL/L de agua dependiendo de la cantidad de materia orgánica presente.
Forma de aplicación:
Aspersión, inmersión, nebulización, termonebulización y espumado.
Presentaciones:
10 L, 25 L y 60 L.





Salud animal
Bienestar humano®

AVES

OFICINAS GENERALES
GUADALAJARA, JALISCO
Av. España No. 1840 Col. Moderna
C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco.
Tel: 01 (33) 3678 1600
Lada sin costo: 01 800 8327 266

agropecuaria@pisa.com.mx
www.pisaagropecuaria.com.mx

Síguenos en: