



CATÁLOGO  
**2019**  
BOVINOS

**PiSA**®  
AGROPECUARIA



# ÍNDICE

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



## BOVINOS 2019



|   |                                              |    |
|---|----------------------------------------------|----|
| ● | ADITIVOS PARA EL ALIMENTO<br>PREMEZCLA       | 6  |
| ● | ANTIINFLAMATORIOS                            | 8  |
| ● | ANTIMICROBIANOS                              | 8  |
| ● | ANTIPARASITARIOS                             | 14 |
| ● | EQUIPOS E IMPLANTES                          | 14 |
| ● | ESTIMULANTES DE APETITO Y<br>HEMATOPOYÉTICOS | 15 |
| ● | HORMONALES Y DIURÉTICOS                      | 18 |
| ● | PREPARADOS DE USO EXTERNO                    | 19 |
| ● | SOLUCIONES Y ELECTROLITOS                    | 19 |
| ● | TERAPIA APARATO<br>DIGESTIVO                 | 21 |
|   | <b>PRODUCTOS DE LANZAMIENTO</b>              | 22 |
|   | <b>BIOSEGURIDAD</b>                          |    |
| ● | CONTROL DE VECTORES                          | 22 |
| ● | <b>DETERGENTES</b>                           | 23 |
| ● | <b>DESINFECTANTES</b>                        | 23 |



**TNK** Enzym



# *Cero Garrapatas Cero días de retiro*



**Tu ganado sin garrapatas, de forma natural**

síguenos en:   

[agropecuaria@pisa.com.mx](mailto:agropecuaria@pisa.com.mx)

[www.pisaagropecuaria.com.mx](http://www.pisaagropecuaria.com.mx)

**Salud animal  
Bienestar humano®**

EA339\_160718





## ● ADITIVOS PARA EL ALIMENTO PREMEZCLA

### A.M.X.® 60% PREMIX

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-221

#### Fórmula:

Cada 100 g contienen:  
Amoxicilina Trihidrato 60 g  
Excipiente cbp 100 g

#### Indicaciones:

A.M.X.® 60% PREMIX es una Amoxicilina, la cual lleva un proceso de revestimiento que la protege sobre cambios ambientales originados por el manejo, proceso, distribución y almacenaje del alimento terminado.

Está indicado para el tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la Amoxicilina en becerros, como son:

Enteritis relacionadas a *E. coli* y *Salmonella spp.*, onfalitis asociado a *E. coli*, *Staphylococcus aureus*, así como otros gérmenes que sean sensibles a la acción de la Amoxicilina.

#### Vía de administración:

Oral, mezclado en el alimento.

#### Dosis:

Beceros lactantes: 500 a 830 g de A.M.X.® 60% PREMIX por tonelada de alimento durante 10 a 20 días, o a criterio del médico veterinario.

Beceros destete: 420 a 600 g de A.M.X.® 60% PREMIX por tonelada de alimento durante 8 a 15 días, o a criterio del médico veterinario.

#### Presentación:

25 kg.

#### USO VETERINARIO



### CLOVIREL®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-183

#### Fórmula:

Cada 100 g contienen:  
Sulfato de Colistina 144'000,000 U.I.  
Excipiente cbp 100 g

#### Indicaciones:

Antibacteriano para el control y tratamiento de enfermedades gastrointestinales causadas por bacterias Gram negativas sensibles a la Colistina, como *E. coli* y *Salmonella spp.*, en bovinos (beceros y vaquillas en sistemas productivos de carne o leche).

#### Vía de administración:

Oral, mezclado en el alimento.

#### Dosis:

##### Control:

• Beceros: 250 g de Clovirel® por tonelada durante 15 días.

##### Curativa:

• Beceros: 500 g de Clovirel® por tonelada durante 15 a 21 días.

#### Presentación:

25 kg.

#### USO VETERINARIO



### COCCILIBER®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-167

#### Fórmula:

Cada 100 g contienen:  
Monensina Sódica  
equivalente a 40 g

Monensina  
Excipiente cbp 100 g

#### Indicaciones:

Indicado en bovinos (productores de carne y leche) y caprinos para el control y tratamiento de coccidiosis, y para disminuir la incidencia de cetosis y timpanismo.

#### Vía de administración:

Oral, mezclado con el alimento.

#### Dosis:

Bovinos y Caprinos:  
De 7 a 33 g de Monensina por tonelada de alimento (17.5 a 82.5 g de COCCILIBER® por tonelada de alimento).

#### Presentación:

25 kg.

#### USO VETERINARIO



### COCCIMAX®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-239

#### Fórmula:

Cada 100 g contienen:  
Decoquinato 12 g  
Excipiente cbp 100 g

#### Indicaciones:

COCCIMAX®: Previene el desarrollo de las coccidias y el daño causado por éstas.

Minimiza las pérdidas causadas por la coccidiosis subclínica. Disponible para prevenir la coccidiosis con efectividad.

Bovinos (productores de carne y leche): Prevención y tratamiento de coccidiosis causada por *E. bovis* y *E. zurnii*.

Caprinos: Prevención y tratamiento de coccidiosis causada por *E. christensenii*, *E. ninakohlyakimovae* y *Cryptosporidium parvum*.

Ovinos: Prevención y tratamiento de coccidiosis causada por *E. bakuensis*, *E. crandallii*, *E. ovinoidalis* y *E. parva*.

#### Vía de administración:

Oral, mezclado con el alimento.

#### Dosis:

Prevención y tratamiento en bovinos, ovinos y caprinos:  
0.5-1.0 mg/kg de peso durante 28 días (0.5-1.0 g de producto terminado por cada 120 kg de peso tratados).

Para la prevención y tratamiento de criptosporidiosis en

Caprinos: 2.5 mg/kg durante 21 días.

#### Presentación:

25 kg.

#### USO VETERINARIO



### ECTOSIN® 0.6% PREMIX

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-109

#### Fórmula:

Cada 100 g contienen:  
Ivermectina 0.6 g  
Excipiente cbp 100 g

#### Indicaciones:

##### ECTOSIN® 0.6% PREMIX:

En bovinos (de carne y terneros) se usa para el control de nematodos pulmonares, gastrointestinales (etapas inmaduras y adultas) y como coadyuvante en el control de parásitos externos, como: piojos y ácaros.

#### Vía de administración:

Oral, mezclado con el alimento.

Dosis: Bovinos: 200-400 µg/kg de peso de 3 a 5 días. Dependiendo de la infestación parasitaria.

#### Presentación:

5 kg.

#### USO VETERINARIO



### MAXIFOLIPOL®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-136

#### Fórmula:

Cada 100 g contienen:  
Flavofosfolipol 4 g  
Excipiente cbp 100 g

#### Indicaciones:

Se usa como promotor de la producción en bovinos de carne, leche y terneros. Es efectivo en el control de bacterias que proliferan en situaciones de alta producción, por ejemplo Gram positivas como *Enterococcus spp.* y *Clostridium perfringens* y Gram negativas como *Salmonella enteritidis*, *E. coli*, *Pasteurella spp.*

#### Vía de administración:

Oral, mezclado con el alimento.

#### Dosis:

| Flavofosfolipol            | Maxifolipol®<br>(g/ton) | Equivalente a Flavofosfolipol<br>(sustancia activa)<br>(g/ton) |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Terneros</b>            |                         |                                                                |
| (en el sustituto de leche) | 400                     | 16                                                             |
| <b>Bovinos en engorda</b>  |                         |                                                                |
| Vacas lecheras             | 50                      | 2                                                              |
|                            | 250                     | 10                                                             |

#### Presentación:

25 kg.

#### USO VETERINARIO



## ● ADITIVOS PARA EL ALIMENTO PREMEZCLA

### PISACOX®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-195

**Fórmula:**  
Cada 1000 g contienen:  
Salinomicina sódica 120 g  
Excipiente cbp 1000 g

**Indicaciones:**

PISACOX®: Para el control de coccidias en bovinos productores de carne, actúa como estabilizador de pH ruminal.

**Vía de administración:**

Oral, mezclado con el alimento.

**Dosis:**

Bovinos:

En becerros y novillos: de 50 a 150 g de PISACOX® por tonelada de alimento (6 a 18 ppm).

En animales con rumen completamente desarrollado: 300 g de PISACOX® por tonelada de alimento (36 ppm).

Presentación: 25 kg

USO VETERINARIO



### ZIPAMIX®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-242

**Fórmula:**  
Cada kg contiene:  
Clorhidrato de Zilpaterol 48 g  
Excipiente cbp 1 kg

**Indicaciones:**

ZIPAMIX® es indicado en ganado bovino de engorda en etapa de finalización para aumentar la tasa de ganancia de peso y mejorar la conversión alimenticia. Aumenta el rendimiento de la canal y disminuye el depósito de grasa para la obtención de carne magra.

**Vía de administración:** Oral, mezclado con el alimento.

**Dosis:**

Adminístrese continuamente durante los últimos 30 días de la engorda en corral, a razón de 0.15 mg de Clorhidrato de Zilpaterol por kg de peso corporal al día. Para aproximarse a la dosis, se deben tomar en cuenta: el promedio de peso corporal de los animales y el promedio individual de consumo de alimento. Por ejemplo, para animales con peso promedio de 400 kg que ingieren, en promedio, 10 kg de alimento terminado (90% de materia seca) por día, se recomiendan 125 g de ZIPAMIX® por tonelada de alimento terminado.

Para el cálculo más preciso de la cantidad de ZIPAMIX® a incluir en la dieta, se recomienda el uso de la siguiente fórmula:

$$\frac{3.15 \text{ (constante)}}{\text{Promedio de consumo de alimento (kg)}} \times \text{Promedio de peso corporal (kg)} = \text{Gramos de Zipamix® por tonelada de alimento}$$

Se sugiere mezclar previamente en la premezcla mineral y vigilar apropiadamente el proceso de mezclado.

Presentación: 10 kg.

USO VETERINARIO



### RACMINA PREMIX® 10%

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-170

**Fórmula:**  
Cada 100 g contienen:  
Clorhidrato de Ractopamina 10 g  
Excipiente cbp 100 g

**Indicaciones:**

RACMINA PREMIX® 10% está indicado para aumentar la tasa de ganancia de peso, mejorar la eficiencia alimenticia, aumentar el porcentaje de rendimiento de canal e incrementar la carne magra en bovinos en finalización, recibiendo una dieta nutricionalmente balanceada.

**Vía de administración:**

Oral, mezclado con el alimento.

**Dosis:**

Se recomienda suministrar de 200 a 300 g de RACMINA PREMIX® 10% por tonelada de alimento.

Se sugiere mezclar previamente la cantidad de RACMINA PREMIX® 10% en la premezcla mineral.

**Presentación:**

10 bolsas de 1 kg y 10 kg.

USO VETERINARIO



### NFL-MAX® CON EXPECTORANTE

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-125

**Fórmula:**  
Cada 100 g contienen:  
Florfenicol 4 g  
Tartrato de Tilosina 11 g  
Clorhidrato de Ambroxol 0.4 g  
Excipiente cbp 100 g

**Indicaciones:**

NFL-MAX® CON EXPECTORANTE premezcla diseñada para el control de las infecciones respiratorias. Su acción se encuentra reforzada por la adición de un agente expectorante: el Ambroxol. También se usa en enfermedades digestivas, respiratorias, de la piel y septicémicas en becerros. NFL-MAX® CON EXPECTORANTE ofrece un control eficiente de infecciones por *Mycoplasma spp.*, *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica* así como colibacilosis.

**Vía de administración:**

Oral, mezclado con el alimento.

**Dosis:**

Se recomienda una dosis de 1.5 kg/tonelada de alimento durante 5 a 10 días, en animales destetados se administra la misma dosis por 5 días.

**Presentación:**

5 kg y 25 kg.

USO VETERINARIO



### PROTECTYL®

REGISTRO S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-288

**Fórmula:**  
Cada 100 g contienen:  
Fosfato de Tilosina 40.0 g  
Excipiente cbp 100 g

**Indicaciones:**

En bovinos de engorda: para la reducción de la incidencia de abscesos hepáticos asociados con *Fusobacterium necrophorum* y *Arcanobacterium pyogenes* durante la engorda en corral.

**Vía de administración:**

Oral, mezclado con el alimento.

**Dosis:**

Para la reducción de la incidencia de abscesos hepáticos asociados con *Fusobacterium necrophorum* y *Arcanobacterium pyogenes* administrar una dosis de 11 ppm (27.5 g/ton) durante toda la finalización en la engorda en corral.

**Presentación:**

Saco de 10 kg con bolsas de 1 kg

USO VETERINARIO



### NEUMOENTER® PREMIX

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-171

**Fórmula:**  
Cada 100 g contienen:  
Clortetraciclina granular 20.0 g  
Excipiente cbp 100.0 g

**Indicaciones:**

Para productores de leche y carne: Pasteurellosis (fiebre de embarque), pododermatitis, septicemias, anaplasmosis, diarreas bacterianas y en la prevención de abscesos hepáticos.

**Vía de administración:**

Oral, mezclado con el alimento.

**Dosis:**

Neumonías bacterianas:

1.5 kg x Ton/alimento

Anaplasmosis:

Animales hasta 300 kg

1.5 kg x Ton/alimento

Animales de 300 a 450 kg

2.5 kg x Ton/alimento


Animales de 450 a 680 kg

4.0 kg x Ton/alimento

**Presentación:**

Saco de 25 kg

USO VETERINARIO





## ● ANTIINFLAMATORIOS

### PISAFLAM®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-199

#### Fórmula:

Cada mL contiene:  
Piroxicam 50 mg  
Vehículo cbp 1 mL

#### Indicaciones:

PISAFLAM® es un antiinflamatorio no esteroideo, analgésico, antirreumático y antipirético que se absorbe rápidamente y no presenta efectos sobre el sistema nervioso central y aparato cardiovascular. Está indicado en bovinos (productores de leche y carne) para el tratamiento de afecciones musculoesqueléticas agudas o crónicas: artritis reumatoide, osteoartritis, bursitis y tendinitis; en procesos infecciosos como: pododermatitis, mastitis, metritis y neumonías, también se recomienda en tratamientos post-operatorios.

#### Vía de administración:

Intramuscular profunda.

Dosis: Administrar de 0.5 a 1.5 mg/kg de peso (1 a 3 mL/100 kg de peso) cada 24 horas, por 3-5 días.

#### Presentación:

Frasco con 100 mL.

USO VETERINARIO



### NAPZIN®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-034

#### Fórmula:

Cada mL contiene:  
Meglumina de Flunixin 50 mg  
Vehículo cbp 1 mL

#### Indicaciones:

Napzin® se indica en bovinos (productores de carne y leche) y ovinos para el control del dolor e inflamación asociada a trastornos musculoesqueléticos en fase aguda y subcrónica, control de la fiebre, hipersecreción y pérdida de la funcionalidad en caso de bronconeumonía, en particular durante la fase aguda y para el control del dolor, fiebre, inflamación y afecciones causadas por endotoxinas en caso de colimastitis bovina y nefritis.

#### Vía de administración:

Bovinos: Intramuscular o intravenosa.


Ovinos: Intravenosa

#### Dosis:

Bovinos y ovinos: 1- 2 mL por cada 50 kg cada 12-24 horas.

Presentación: Frasco ampula con 50 mL, 100 mL y 250 mL.

USO VETERINARIO



### A.M.X.® L-A

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-104

#### Fórmula:

Cada mL contiene:  
Amoxicilina 150 mg  
(como Amoxicilina Trihidrato)  
Vehículo cbp 1 mL

#### Indicaciones:

A.M.X.® L-A es una fórmula de larga acción de Amoxicilina diseñada para mantener concentraciones terapéuticas por 36 a 48 horas postaplicación. Indicado para el tratamiento de los bovinos (productores de carne y leche), ovinos y caprinos en las infecciones del aparato respiratorio, de la glándula mamaria, genitourinarias, del sistema nervioso, del aparato locomotor, digestivas y septicemias, producidas por gérmenes sensibles a la Amoxicilina; gérmenes Gram positivos y Gram negativos, como son: *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Pasteurella* spp., *Clostridium* spp., *Corynebacterium* spp., *Fusobacterium* spp. y *Bordetella*.

Vía de administración: Intramuscular y subcutánea.

#### Dosis:

15 mg/kg de peso (1 mL por cada 10 kg de peso). La dosis se puede repetir a las 48 horas después de la primera aplicación, a criterio del Médico Veterinario Zootecnista.

Si el volumen de aplicación excede los 20 mL, la dosis deberá dividirse para aplicarse en dos sitios diferentes.

Presentación: Frasco con 100 mL.

USO VETERINARIO



### ALNEX®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-013

#### Fórmula:

Cada mL contiene:  
Dipirone 500 mg  
Vehículo cbp 1 mL

#### Indicaciones:

Está indicado en bovinos (carne), ovinos, caprinos; como analgésico, antipirético, antiespasmódico y coadyuvante antiinflamatorio.

•Se recomienda para bajar rápidamente la fiebre que se presenta en enfermedades infecciosas.

•Para mitigar el dolor en los espasmos gastrointestinales y de útero (cólicos), en heridas, contusiones, desgarres, afecciones musculares y articulares.

•Obstrucciones por cuerpos extraños en esófago.

•Contra el dolor y/o fiebre postquirúrgicos.

•Para prevenir el dolor en maniobras exploratorias como en ginecología, traumatología, ortopedia, urología, odontología y cólicos intestinales.

#### Vía de administración:

Intravenosa lenta o intramuscular profunda cada 4 a 8 horas.

#### Dosis:

En general, la dosificación es de 25 mg/kg de peso corporal.

Se recomiendan:

Bovinos: 20-60 mL

Temeros: 5-15 mL

Ovinos y caprinos: 2-8 mL

Presentación: Frasco con 100 mL y 250 mL.

USO VETERINARIO



## ● ANTIMICROBIANOS

### 3 SULFAS® INJECTABLE

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-008

#### Fórmula:

Cada 100 mL contienen:  
Sulfametazina 6.66 g  
Sulfamerazina 6.66 g  
Sulfadiazina 6.66 g  
Vehículo cbp 100 mL

#### Indicaciones:

3 SULFAS® INJECTABLE:

Se usa en el tratamiento de los bovinos, ovinos y caprinos en las infecciones causadas por gérmenes sensibles a las sulfas.

Vía de administración: Intravenosa, intramuscular.

Dosis: Véase instructivo

#### Presentación:

Frasco con 100 mL, 250 mL y 500 mL.

USO VETERINARIO



### A.M.X.® 50% Soluble

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-127

#### Fórmula:

Cada 100 g contienen:  
Amoxicilina trihidratada 50 g  
Excipiente cbp 100 g

#### Indicaciones:

A.M.X.® 50% Soluble: Se usa para la prevención y tratamiento de enfermedades que afectan a bovinos, cerdos y aves que son causadas por gérmenes sensibles a la Amoxicilina, tales como: enfermedades respiratorias, onfalitis, enteritis infecciosa, artritis, colibacilosis, salmonelosis e infecciones urinarias.

Vía de administración: Oral, en el agua de bebida.

#### Dosis:

La dosis recomendada de Amoxicilina es de 10 a 20 mg/kg de peso durante 3 a 5 días.

Bovinos: Esta dosis se obtiene agregando diariamente 25 a 50 g de A.M.X.® 50% Soluble (dependiendo del consumo de agua y el peso de los animales) por cada 100 litros de agua de bebida. Nota: Es recomendable realizar una pre-dilución de la dosis en un volumen menor de agua (25 a 50 g de A.M.X.® 50% Soluble en 10 a 20 litros de agua) y después mezclar con el resto del agua, en el tanque o bebedero.

Presentación: 500 g.

USO VETERINARIO



## ● ANTIMICROBIANOS

### ACTYNOXEL® RTU

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-112

#### Fórmula:

Cada 100 mL contienen:  
Clorhidrato de Ceftiofur 5 g  
Vehículo cbp 100 mL

#### Indicaciones:

Bovinos (productores de carne y leche): Para el tratamiento de la enfermedad respiratoria bovina (ERB), necrobacilosis interdigital (gabarro), fiebre de embarque, neumonía asociada con *Pasteurella hemolytica*, *Pasteurella multocida* y *Haemophilus somnus*. Así como también para el tratamiento de la metritis.

#### Vía de administración:

Intramuscular o subcutánea.

#### Dosis:

Bovinos: 1 a 2 mg por kg de peso (1 a 2 mL/50 kg) cada 24 horas durante 3 a 5 días, I.M. o S.C.

#### Presentación:

Frasco con 100 mL y 250 mL.

#### USO VETERINARIO



### BASETYL® MAX

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-243

#### Fórmula:

Cada 100 mL contienen:  
Florfenicol 20 g  
Tilosina base 20 g  
Clorhidrato de Bromhexina 0.5 g  
Vehículo cbp 100 mL

#### Indicaciones:

**BASETYL® MAX:** Es una mezcla de antibióticos de amplio espectro y un expectorante. En los bovinos de carne, terneros y ganado lechero que no se encuentren en producción láctea, se usa para el tratamiento de enfermedades respiratorias, diarreas de terneros, pododermatitis, queratitis, infecciones del tracto genital e infecciones en general causadas por: *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Klebsiella* spp., *Shigella* spp., *Moraxella* spp., *Histophilus somni*, *Haemophilus somnus*, *Corynebacterium pyogenes*, *E. coli*, *Salmonella*, *Streptococcus*, *Staphylococcus*, *Bacteroides nodosus* y *Bacteroides melaninogenicus*; así como las infecciones asociadas o complicadas por *Mycoplasmas* como *Mycoplasma bovis* y *Mycoplasma spp.*

#### Vía de administración:

Intramuscular profunda o subcutánea.


#### Dosis:

1 mL por cada 20 kg de peso, si los signos persisten, repetir la aplicación del producto a las 48 o 72 horas.

#### Presentaciones:

Frasco con 100 mL y 200 mL.

#### USO VETERINARIO



### GENTALEX® FUERTE 100

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-047

#### Fórmula:

Cada mL de solución contiene:  
Sulfato de Gentamicina equivalente a 100 mg  
de Gentamicina base  
Vehículo cbp 1 mL

#### Indicaciones:

**GENTALEX® FUERTE 100:** Solución estéril inyectable de Gentamicina, indicada en neumonías, diarreas, mastitis, metritis, infecciones en vías urinarias, septicemias producidas por bacterias sensibles a la Gentamicina, tales como: *Salmonella* spp., *Enterobacter aerogenes*, *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp., *Neisseria*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus* spp., *Shigella*, *Pasteurella multocida*, *Staphylococcus* spp. y *Corynebacterium* spp., que afectan a los bovinos (productores de carne y leche) que no están en producción láctea, ovinos y caprinos.

#### Vía de administración:

Intramuscular e intrauterina.

#### Dosis:

En general para todas las especies, utilizar de 2 a 5 mg por kg de peso aplicándolo según sea el caso:

En infecciones respiratorias y septicémicas: Administrar 1 mL por cada 20 kg de peso (5 mg por kg de peso), por vía intramuscular durante 3 a 5 días.


En infecciones intestinales y genitourinarias: Administrar 1 mL por cada 20 kg de peso (5 mg por kg de peso) por vía intramuscular durante 3 a 5 días.

Para metritis, endometritis y cervicitis: Diluir 10 mL de Gentalex® Fuerte 100 con 90 mL de solución salina estéril y aplicar de 20 a 100 mL por vía intrauterina, cada 24 horas hasta que desaparezcan los signos.

#### Presentación:

12 frascos de 100 mL c/u

#### USO VETERINARIO



### BASETYL® 200

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-105

#### Fórmula:

Cada mL contiene:  
Tilosina Base BP 200 mg  
Vehículo cbp 1 mL

#### Indicaciones:

**BASETYL® 200** está indicado en bovinos productores de carne y leche (que no están en producción láctea) para el tratamiento de complejo respiratorio (fiebre de embarque, neumonía), pododermatitis necrótica (gabarro), difteria de los terneros, mastitis y metritis. En cabras está indicado para el tratamiento de agalactia contagiosa y pleuroneumonía.

#### Vía de administración:

Intramuscular profunda.

#### Dosis:

En bovinos productores de carne y leche (que no se encuentran en producción láctea) y cabras no lactantes, la dosis a emplear es de 1 mL por cada 10 a 20 kg de peso/día que corresponde a una dosis de 10 a 20 mg/kg de peso corporal. Realizar el tratamiento cada 24 a 48 horas o hasta la desaparición de signología de la enfermedad sin exceder los 5 días de tratamiento.

#### Presentación:

Frasco con 250 mL.

#### USO VETERINARIO



### FUREAL® N.F.

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-113

#### Fórmula:

Cada bolo contiene:  
Urea 13.4 g  
Excipiente cbp 1 bolo

#### Indicaciones:

**FUREAL® N.F.** es un bolo antiséptico de uso intrauterino para ser utilizado durante el periodo post-parto a fin de lograr un rápido retorno al celo en las hembras de bovinos. Como coadyuvante en la eliminación de la placenta o membranas retenidas en el útero después del parto.

#### Vía de administración:

Intrauterina.

#### Dosis:

Administrar 2 bolos después del parto, introduciendo el producto con la mano dentro de la matriz bajo condiciones asépticas. En caso necesario la aplicación puede repetirse a las 24 horas.

#### Presentación:

50 bolos.

#### USO VETERINARIO



### GENTALEX® FUERTE

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-062

#### Fórmula:

Cada mL de solución contiene:  
Sulfato de Gentamicina equivalente a 50 mg  
de Gentamicina base  
Vehículo cbp 1 mL

#### Indicaciones:

**GENTALEX® FUERTE:** Solución estéril inyectable de Gentamicina, indicada en neumonías, diarreas, mastitis, metritis, infecciones en vías urinarias y septicemias producidas por bacterias sensibles a la Gentamicina, tales como: *Salmonella* spp., *Enterobacter aerogenes*, *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp., *Neisseria*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus* spp., *Shigella*, *Pasteurella multocida*, *Staphylococcus* spp. y *Corynebacterium* spp., que afectan a los bovinos (productores de carne y leche) que no están en producción láctea, ovinos y caprinos.

#### Vía de administración:

Intramuscular e intrauterina.

#### Dosis:

En general para todas las especies, utilizar de 2 a 5 mg por kg de peso aplicándolo según sea el caso:

En infecciones respiratorias y septicémicas: Administrar 5 mg por kg de peso corporal (1 mL por cada 10 kg de peso), por vía intramuscular durante 3 a 5 días.

En infecciones intestinales y genitourinarias: administrar 4 mg por kg de peso corporal (2 mL por cada 25 kg de peso) por vía intramuscular durante 3 a 5 días.

Para metritis, endometritis y cervicitis: diluir 20 mL de Gentalex® Fuerte con 80 mL de solución salina estéril y aplicar de 20 a 100 mL por vía intrauterina, cada 24 horas hasta que desaparezcan los signos.

#### Presentación:

Frasco con 250 mL y 100 mL

#### USO VETERINARIO





## ● ANTIMICROBIANOS

### GENTAMAST®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-063

#### Fórmula:

Cada jeringa con 10 mL contiene:  
Sulfato de Gentamicina  
equivalente a 150 mg  
de Gentamicina base  
Sulfato de Colimicina  
equivalente a 80,000 U.I.  
de Colimicina  
Dexametasona 0.500 mg  
Vehículo cbp 10 mL

#### Indicaciones:

GENTAMAST® es una solución antimicrobiana adicionada con un antiinflamatorio, para el tratamiento y control de mastitis en vacas durante el periodo de producción lechera. Indicado en el tratamiento de mastitis clínicas y subclínicas, agudas y crónicas, causadas por gérmenes sensibles a la acción antimicrobiana de la Gentamicina y la Colimicina. La acción de la Dexametasona facilita el paso de los antibióticos a través de la barrera inflamatoria.

#### Vía de administración:

Intramamaria.

Dosis: Aplicar el contenido de una jeringa (10 mL) en cada cuarto afectado y repetir la aplicación cada 12 hrs, para un total de 2 o 3 días continuos de tratamiento.

#### Presentación:

Cubeta con 30 jeringas de 10 mL c/u

USO VETERINARIO



### GENTAERBA® INYECTABLE

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-004

#### Fórmula:

Cada 100 mL contienen:  
Sulfato de Gentamicina equivalente a 10 g  
de Gentamicina  
Vehículo cbp 100 mL

#### Indicaciones:

Para el tratamiento de infecciones producidas por gérmenes susceptibles a la Gentamicina que afectan a los bovinos (productores de leche y carne).

#### Esquema de dosificación y vía de administración:


Para bovinos y ovinos:

|                                | DOSIS                             | ADMINISTRACIÓN | DURACIÓN        |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| INFECCIONES RESPIRATORIAS      | 1 mL por cada 20 kg de peso       | Intramuscular  | De 3 a 5 días   |
| INFECCIONES GASTROINTESTINALES | 1 mL por cada 25 kg de peso       | Intramuscular  | De 3 a 5 días   |
| METRITIS                       | 10 mL en 40 mL de solución Salina | Intrauterino   | Según evolución |
| INFECCIONES URINARIAS          | 1 mL por cada 25 kg de peso       | Intramuscular  | De 3 a 5 días   |

#### Presentación:

Frasco con 100 mL

USO VETERINARIO



### MASTICLYN® SECADO

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-168

#### Fórmula:

Cada jeringa contiene:  
Cloxacilina Benzatinica  
equivalente a 500 mg  
de Cloxacilina  
Vehículo cbp 10 mL

#### Indicaciones:

MASTICLYN® SECADO está indicado para la prevención y tratamiento de mastitis en el ganado lechero (bovino) durante el periodo seco. Es efectivo contra gérmenes Gram positivos tales como: *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus agalactiae* e incluye a los estafilococos resistentes a las penicilinas.

#### Vía de administración:

Intramamaria.

#### Dosis:

1 jeringa por cuarto, al final del último ordeño a fondo; después de la limpieza y desinfección del pezón, administrar una jeringa por pezón y no volver a ordeñar hasta la siguiente lactancia.

Para lograr una mejor difusión realice un ligero masaje sobre el pezón y la ubre.

#### Presentación:

36 jeringas con 10 mL.

USO VETERINARIO



### MASTILIBER®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-085

#### Fórmula:

Cada 100 mL de solución contienen:  
Gel de Aloe vera Barbadensis 14 g  
Aceite de Citrus mexicana 0.010 g  
Extracto hidroalcohólico de *Symphytum consolida* 0.010 g  
Extracto acuoso de Agave mexicana 0.200 g  
Aceite de *Maleleuca alternifolia* 0.002 g  
Sulfato de zinc 0.002 g  
Vehículo y estabilizantes cbp 100 mL

#### Indicaciones:

MASTILIBER® es el único antimastítico que ofrece 0 días de retiro en leche y está indicado en el tratamiento de infecciones de la glándula mamaria (mastitis) de los animales domésticos relacionadas con cepas de las siguientes bacterias: *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Escherichia coli*, *Shigella spp.* y *Salmonella spp.*

#### Vía de administración:

Intramamaria.

#### Dosis:

Aplicar una jeringa de MASTILIBER® cada 12 horas en el cuarto afectado después de la ordeña. Dependiendo de la severidad de la mastitis se aplicará como mínimo 2 días consecutivos y en casos crónicos un mínimo de 4 días.

#### Presentación:

Cubeta con 30 jeringas de 10 mL c/u

USO VETERINARIO



### PENBACORT®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-285

#### Fórmula:

Cada mL contiene:  
Penicilina G Procaína 200,000 U.I.  
Dihidroestreptomicina 250 mg  
(como sulfato)  
Flumetasona 0.125 mg  
Vehículo cbp 1 mL

#### Indicaciones:

Combinación de Penicilina y Estreptomicina con un corticosteroide; indicado para el tratamiento de neumonías, procesos inflamatorios infecciosos y otras infecciones causadas por gérmenes susceptibles a la fórmula.

#### Vía de administración:

Intramuscular profunda.  
Dosis: 1 mL por cada 20 kg de peso.

#### Presentación:

12 frascos con 100 mL.

USO VETERINARIO



### PENBACORT® Polvo

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-080

#### Fórmula:

El frasco ampula con polvo contiene:  
Penicilina G Sódica 1'000,000 U.I.  
Penicilina G Procaína 3'000,000 U.I.  
Estreptomicina sulfato equivalente a 5 g  
de Estreptomicina base  
Dexametasona 21 fosfato 4 mg  
La ampolla con diluyente contiene: 10 mL

#### Indicaciones:

PENBACORT® Polvo es una combinación antibiótica más un desinflamatorio corticosteroide en suspensión inyectable, indicado para bovinos (productores de carne y leche), ovinos y caprinos para el control y tratamiento de infecciones ocasionadas por gérmenes susceptibles a la acción de la Penicilina y Estreptomicina, reforzado por la acción de la Dexametasona que facilita el paso de los antibióticos a través de la barrera inflamatoria, permitiéndoles llegar en mayores cantidades, distribuirse y actuar en el sitio afectado. PENBACORT® Polvo está indicado en mastitis, metritis, neumonías, pasteurelosis y pododermatitis necrótica (gabarro).

#### Vía de administración:

Intramuscular profunda.

#### Dosis:

Bovinos, ovinos y caprinos:  
1 mL por cada 25 kg de peso.

#### Presentación:

Frasco ampula con polvo 4 millones de U.I. y ampolla con diluyente de 10 mL.

USO VETERINARIO



## ANTIMICROBIANOS

### PENBALEX® AQUA

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-208

#### Fórmula:

Cada mL contiene:  
Penicilina G Procaína estéril 300,000 U.I.  
Clorhidrato de Procaína 20 mg  
Vehículo cbp 1 mL

#### Indicaciones:

**PENBALEX® AQUA:** Se indica para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias aerobias y anaerobias Gram positivas, tales como: *Streptococcus beta-hemolíticos*, *Streptococcus beta-lactamasas negativos*, *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus equi*, *Actinomyces spp.*, *Bacillus anthracis*, *Clostridium chauvoei*, *Clostridium septicum*, *Clostridium tetani*, *Corynebacterium spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Fusobacterium spp.* y *Actinomyces pyogenes* que causan neumonías, rinitis, faringitis, meningitis, fiebre carbonosa, gábarro, gangrena, mastitis, metritis, artritis, leptospirosis, tétanos y erisipela.

#### Vía de administración:

Intramuscular.

#### Dosis:

Administrar de 11,000 a 22,000 U.I. por kg de peso vivo cada 12 a 24 horas (1 a 2 mL por cada 27 kg de peso corporal), por un periodo de 3 a 5 días o de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

#### Presentación:

Frasco con 250 mL.

#### USO VETERINARIO



### PENBALEX® L-A

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-119

#### Fórmula:

Cada mL contiene:  
Penicilina G Benzatínica 150,000 U.I.  
Penicilina G Procaína 150,000 U.I.  
Clorhidrato de Procaína 20 mg  
Vehículo cbp 1 mL

#### Indicaciones:

**PENBALEX® L-A**, suspensión inyectable, es una combinación antibiótica de efecto rápido y acción prolongada adicionada con Clorhidrato de Procaína para evitar el dolor en el sitio de aplicación.

Está indicada para el tratamiento de infecciones bacterianas en bovinos (productores de carne y leche), tales como:

- Neumonía bacteriana-complejo fiebre del embarque- (*Streptococcus spp.*, *Corynebacterium pyogenes* y *Staphylococcus aureus*).
- Infecciones del tracto respiratorio superior como rinitis o faringitis (*Corynebacterium pyogenes*).
- Fiebre carbuncular (*Clostridium chauvoei*).

#### Vía de administración:

Subcutánea e intramuscular profunda.

#### Dosis:

1 mL por cada 15 a 30 kg de peso corporal (10,000 U.I. de Penicilina G Benzatínica y 10,000 U.I. de Penicilina G Procaína por kg de peso corporal) puede repetir el tratamiento a las 48 horas.

#### Presentación:

Frasco con 100 mL y 250 mL.

#### USO VETERINARIO



### PENDIBEN® COMPUESTO

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-138

#### Fórmula:

El frasco ámpula con polvo contiene:

Penicilina G Procaína 18'750,000 U.I.  
Penicilina G Sódica 6'250,000 U.I.  
Penicilina G Benzatínica 25'000,000 U.I.

Sulfato de Dihidroestreptomicina  
equivalente a 18.75 g

de Dihidroestreptomicina  
Sulfato de Estreptomicina equivalente a 18.75 g  
de Estreptomicina

#### El frasco con diluyente contiene:

Solución CS  
(cloruro de sodio 0.9% w/v) 250 mL

Hecha la mezcla, la suspensión tiene un volumen final de aprox. 312 mL.  
Cada mL contiene, en promedio, 160,000 U.I. de Penicilinas y 120 mg de Estreptomicinas.

#### Indicaciones:

Combinación antibiótica indicada en el tratamiento de infecciones en bovinos, causadas por una amplia variedad de bacterias Gram positivas y Gram negativas susceptibles a la Penicilina y Estreptomicina.

#### Vía de administración:

Intramuscular profunda exclusivamente.

#### Dosis:

##### En las especies bovina:


De 11,000 U.I./kg a 22,000 U.I./kg de peso  
(2 mL por cada 15 a 30 kg de peso) por un periodo de 3 a 5 días.

#### Presentación:

Frasco ámpula con polvo con 50 millones de U.I. de Penicilinas y 37.5 g de Estreptomicinas.

Frasco con diluyente con 250 mL

#### USO VETERINARIO



### PIROFLOX® 5%

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-032

#### Fórmula:

Cada mL contiene:  
Enrofloxacin 50 mg  
Vehículo cbp 1 mL

#### Indicaciones:

**PIROFLOX®:** Bactericida y micoplásmico de amplio espectro indicado para el tratamiento de las enfermedades infecciosas causadas por bacterias Gram negativas, Gram positivas y micoplasmas, tales como: *Escherichia coli*, *Enterobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Salmonella spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Haemophilus spp.*, *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.* y *Mycoplasma spp.*

#### Vía de administración:

Bovinos: Intramuscular.

#### Dosis:

Cerdos, bovinos, ovinos y caprinos: 2.5 a 7.5 mg/kg de peso corporal cada 24 hrs (1 mL por cada 6.6 a 20 kg de peso corporal).

#### Presentación:

Frasco de plástico con 250 mL.

#### USO VETERINARIO



### FLUFLOX® XPECTRO

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-277

#### Fórmula:

Cada mL contiene:  
Florfenicol 450 mg  
Vehículo cbp 1 mL

#### Indicaciones:

Es una solución con acción antimicrobiana de amplio espectro, la cual se usa en el tratamiento de infecciones respiratorias en bovinos cárnicos y lecheros (que no sean vacas en producción láctea destinadas para consumo humano) causadas por *Manheimia haemolytica*, *Mycoplasma bovis*, *Pasteurella multocida*, e *Histophilus somni*; en la pododermatitis infecciosa bovina asociada con: *Fusobacterium necrophorum*, *Bacteroides melaninogenicus* y/o *Bacteroides nodosus*; así como para la queratoconjuntivitis infecciosa bovina causada por *Moraxella bovis*.

#### Vía de administración:


#### Dosis:

Bovinos: una sola dosis de 4 mL/45 kg (equivalente a 40 mg/kg) vía SC ó 2 dosis de 2 mL/45 kg (equivalente a 20 mg/kg) por vía IM con intervalo de 48 horas.

#### Presentación:

Frasco con 100 mL y 250 mL

#### USO VETERINARIO



### PIROFLOX® 10%

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-033

#### Fórmula:

Cada mL contiene:  
Enrofloxacin 100 mg  
Vehículo cbp 1 mL

#### Indicaciones:

Bactericida y micoplásmico de amplio espectro indicado para el tratamiento de las enfermedades respiratorias y digestivas en bovinos (productores de carne y leche) causadas por gérmenes Gram negativos, Gram positivos y micoplasmas, ya sean éstas sencillas o mixtas como: *Escherichia coli*, *Enterobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Salmonella spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Haemophilus spp.*, *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.* y *Mycoplasma spp.* Su formulación permite que sea utilizado el producto tanto por vía parenteral como en agua de bebida.

#### Vía de administración:

Intramuscular y subcutánea en bovinos.

#### Dosis:

Parenteral:  
Bovinos: 1 a 3 mL por cada 40 kg de peso (2.5 a 7.5 mg/kg), a criterio del MVZ.

#### Presentación:

Frasco con 250 mL.

#### USO VETERINARIO





## ● ANTIMICROBIANOS

### PIROFLOX® PLUS

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-186

#### Fórmula:

Cada 100 mL contienen:  
Enrofloxacin 10 g  
Bromhexina 0.5 g  
Vehículo cbp 100 mL

#### Indicaciones:

PIROFLOX® Plus, es un producto que combina: un antimicrobiano de amplio espectro, la Enrofloxacin, con el efecto mucolítico y expectorante de la Bromhexina. Está indicado para el tratamiento en las enfermedades respiratorias, causadas por: *Actinobacillus spp.*, *Bacillus cereus*, *Bacteroides spp.*, *Bordetella bronchiseptica*, *Campylobacter spp.*, *Citrobacter spp.*, *E. Coli*, *Clostridium perfringens*, *Klebsiella spp.*, *Haemophilus paragallinarum* y *gallinarum*, *Pasteurella spp.*, *Salmonella spp.*, *Proteus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Corynebacterium pyogenes*, *Pseudomona aeruginosa*, *Mycoplasma spp.*, *Moraxella Boris* y *Vibrio parahaemolyticus*.

#### Vía de administración:

Intramuscular.

#### Dosis:

En bovinos, ovinos y caprinos: 1 mL/20 a 40 kg de peso corporal (2.5 a 5 mg/kg), cada 12 o cada 24 horas por un periodo de 3 a 5 días.

#### Presentación:

Frasco con 250 mL.

#### USO VETERINARIO



### SEBACICLINA® 50

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-015

#### Fórmula:

Cada mL contiene:  
Oxitetraciclina HCl 50 mg  
Vehículo cbp 1 mL

#### Indicaciones:

Antibiótico de amplio espectro indicado para la prevención y tratamiento de enfermedades causadas por bacterias Gram positivas y Gram negativas, tales como: *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Klebsiella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Mycoplasma spp.*, *Haemophilus spp.*, *Salmonella spp.*, *Clostridium spp.*, *Fusobacterium spp.*, *Escherichia coli*, *Clamidia*, *Rickettsia*, *Anaplasma* y *Ehrlichia* que causan infecciones respiratorias (neumonías, fiebre de embarque), digestivas (gastroenteritis), uterinas (metritis, endometritis, piometra), urinarias, peritonitis, mastitis, pododermatitis y anaplasmosis, que afecta a bovinos (productores de carne y leche), ovinos y caprinos.

#### Vía de administración:

Intramuscular, intravenosa o subcutánea.

#### Dosis:

De 5 a 10 mg/kg de peso corporal (1 mL por cada 5 a 10 kg de peso) cada 12 a 24 horas.

#### Presentación:

Frasco con 500 mL.

#### USO VETERINARIO



### PISAMIX® CONCENTRADO

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-154

#### Fórmula:

Cada 100 g contienen:  
Sulfacloropiridazina sódica 60.0 g  
Trimetoprim 12.0 g  
Excipiente cbp 100.0 g

#### Indicaciones:

PISAMIX® CONCENTRADO está indicado para la profilaxis y terapia de infecciones provocadas por bacterias Gram positivas (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium perfringens*) y Gram negativas (*E. coli*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella spp.*, *haemophilus spp.*) e infecciones ocasionadas por algunos protozoarios (*Toxoplasma* y *coccidia*).

PISAMIX® CONCENTRADO está indicado en becerros.

#### Vía de administración:

Oral, mezclado en el alimento o agua de bebida.

#### Dosis:

Como dosis indicativa para becerros. Se recomiendan 24 mg de sustancia activa total (Sulfacloropiridazina Sódica-Trimetoprim) por kg de peso vivo equivalente a 1 g de producto terminado por cada 30 kg de peso vivo por día.

#### Presentación:

5 kg.

#### USO VETERINARIO



### PISAMIX® PLUS

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-093

#### Fórmula:

Cada 100 g contienen:  
Sulfacloropiridazina sódica 10.0 g  
Trimetoprim 2.0 g  
Excipiente cbp 100.0 g

#### Indicaciones:

PISAMIX® PLUS está indicado para la profilaxis y terapia de infecciones provocadas por bacterias Gram positivas (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium perfringens*), Gram negativas (*E. coli*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Haemophilus spp.*) e infecciones ocasionadas por algunos protozoarios (*Toxoplasma* y *coccidia*).

PISAMIX® PLUS está indicado becerros.

#### Vía de administración:

Oral, mezclado en el alimento o agua de bebida.

#### Dosis:

Beceros: 10 g por cada 50 kg de peso vivo, durante un periodo de 3 a 5 días por vía oral, en el agua de bebida.

#### Presentación:

5 kg.

#### USO VETERINARIO



### SEBACICLINA® M.F.

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-100

#### Fórmula:

Cada mL contiene:  
Oxitetraciclina (como Oxitetraciclina Clorhidrato) 20 mg  
Flunixin (como Meglumina de Flunixin) 1 mL  
Vehículo cbp 1 mL

#### Indicaciones:

Sebaciclina® M.F. es una combinación de Oxitetraciclina (antibiótico de amplio espectro) y Meglumina de Flunixin (antiinflamatorio no esterooidal), con acción analgésica, antipirética, antiendotóxica y antiinflamatoria. Está indicado para el control de las enfermedades infecciosas de los bovinos (productores de carne y leche), ovinos y caprinos, ocasionadas por gérmenes sensibles a la Oxitetraciclina, donde la terapia con un analgésico, antipirético, antiinflamatorio y antiendotóxico sea deseable. La Sebaciclina® M.F. se indica para el tratamiento de las enfermedades respiratorias (especialmente las asociadas a *Pasteurella multocida*) y la mastitis aguda (en conjunto con una adecuada terapia intramamaria).

#### Vía de administración:

Intravenosa e intramuscular profunda. No se debe de administrar más de 20 mL en el mismo sitio de aplicación; la dosis por arriba de 20 mL se tendrá que dividir en dos o más sitios de aplicación.

#### Dosis:

1 mL de Sebaciclina® M.F. por cada 10 kg de peso (equivalente a 10 mg de Oxitetraciclina y 2 mg de Meglumina de Flunixin por kilogramo de peso) diariamente hasta por 5 días.

#### Presentación:

Frasco con 100 mL.

#### USO VETERINARIO



## TILMI®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-219

### Fórmula:

Cada mL contiene:  
Fosfato de Tilmicosina  
equivalente a  
de Tilmicosina 300 mg  
Vehículo cbp 1 mL

### Indicaciones:

TILMI® se indica para el tratamiento de la enfermedad respiratoria en ganado bovino (productores de leche y carne) y enfermedad respiratoria en ganado ovino causada por *Mannheimia haemolytica* (*Pasteurella haemolytica*), *Pasteurella multocida* así como gérmenes asociados a la mastitis clínica de los ovinos en producción y en el periodo de secado del ganado lechero para la prevención de la mastitis aguda postparto y otros organismos susceptibles a la Tilmicosina, particularmente: *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus uberis*.

### Vía de administración:

Subcutánea: Se recomienda aplicar la inyección por debajo de la piel en el área del cuello.  
Intramamaria: Sólo en ganado lechero al secado.

### Dosis:

En bovinos y ovinos: Aplicar una sola dosis subcutánea de 10 mg/kg de peso corporal (1 mL por 30 kg de peso.) No inyecte más de 20 mL por sitio de inyección. Si no se observa mejora dentro de las 48 horas siguientes a la inyección, el diagnóstico deberá ser reevaluado.  
En ganado lechero al secado: 1000 a 1500 mg por cada cuarto.

### Presentación:

Frasco con 100 mL.

USO VETERINARIO



## ECTOSIN® MP

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-114

### Fórmula:

Cada 100 mL contienen:  
Ivermectina 1 g  
Vehículo cbp 100 mL

### Indicaciones:

Antiparasitario de amplio espectro, para el tratamiento y control de parásitos internos y algunos externos (piojos y sarna) de los bovinos y ovinos.

### Vía de administración:

Subcutánea exclusivamente.

### Dosis:

200 mcg/kg de peso corporal.

### Presentación:

Frasco con 500 mL y 1000 mL.

USO VETERINARIO



## ECTOSIN® LA

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-235

### Fórmula:

Cada mL contiene:  
Ivermectina 31.50 mg  
Vehículo cbp 1 mL

### Indicaciones:

ECTOSIN® LA antiparasitario de acción prolongada, está indicado para el control y tratamiento de nematodos (gastrointestinales y pulmonares) y parásitos externos como larvas de moscas, piojos y ácaros en bovinos de carne.

### Vía de administración:

Por vía subcutánea en el área de la escápula (paleta) o en el cuello.

### Dosis:

1 mL por cada 50 kg de peso vivo.

### Presentación:

Frasco con 500 mL.

USO VETERINARIO



## COCCITRAK® 5%

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-202

### Fórmula:

Cada mL contiene:  
Toltrazuril 50 mg  
Vehículo cbp 1 mL

### Indicaciones:

COCCITRAK® 5% se usa en la prevención y tratamiento de infecciones causadas por coccidias y protozoarios en bovinos (productores de leche y de carne), ovinos y caprinos. Su amplio espectro incluye todas las especies de coccidias en todas sus fases incluyendo esquizogonia y gametogonia. Su actividad contra macro y microgametos lo caracteriza sobre otros compuestos anticoccidianos.

También se utiliza contra toxoplasma, sarcocystis, theileria, isosporas y cystisporas.

Es compatible con aditivos alimenticios, otros anticoccidianos y medicamentos comúnmente empleados en la producción.

No interfiere negativamente en la ganancia de peso y la conversión alimenticia.

No altera el consumo de agua ni de alimento.

### Vía de administración:

Oral.

### Dosis:

Bovinos (productores de leche y de carne), ovinos y caprinos: 20 mg/kg de peso vivo (1 mL/2.5 kg de peso vivo).

En becerros se recomienda una dosis de 15 mg/kg de peso vivo (1 mL/3.3 kg de peso vivo).

En caso de *Theileria annulata* en bovinos se recomienda aumentar la dosis a 25 mg/kg de peso vivo (1 mL/2 kg de peso vivo).

### Presentación:

Frasco con 250 mL y un dosificador.

USO VETERINARIO



## FENPIZOL® 22%

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-022

### Fórmula:

Cada g contiene:  
Fenbendazol 0.22 g  
Excipiente cbp 1 g

### Indicaciones:

FENPIZOL® antihelmíntico de amplio espectro, de uso oral, mezclado en el alimento. Indicado en estadios larvarios y adultos de nematodos gastrointestinales y pulmonares; presenta actividad ovicida.

En bovinos (productores de carne y leche) tiene eficacia contra: *Haemonchus contortus*, *Ostertagia ostertagi*, *Trichostrongylus axei*, *Bunostomum phlebotomum*, *Cooperia* spp., *Trichostrongylus colubriformis*, *Oesophagostomum radiatum* y *Dictyocaulus viviparus*.

### Vía de administración:

Oral, mezclado con el alimento.

### Dosis:

Dosis general: 5 mg/kg de peso, (lo que corresponde a un sobre de FENPIZOL® 22%, por un bovino de hasta 450 kg).

Para tratamiento de *Ostertagia ostertagi* 10 mg/kg de peso (que corresponde a 2 sobres de FENPIZOL® 22%, por cada bovino de hasta 450 kg).

### Presentación:

50 sobres de 10.23 g c/u

USO VETERINARIO





## ● ANTIPARASITARIOS

### LARVOPEC®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-227

#### Fórmula:

Cada mL contiene:  
Doramectina 10 mg  
Vehículo cbp 1 mL

#### Indicaciones:

**LARVOPEC®:** Antiparasitario-endectocida de amplio espectro que se usa en el tratamiento y control de parasitosis internas y externas que afectan la salud y productividad del ganado bovino y ovino.

**Bovinos:** se usa en las infestaciones por vermes redondos gastrointestinales, pulmonares y oculares, larvas de moscas (barros), piojos y ácaros de la sama.

**Ovinos:** se usa en infestaciones por parásitos gastrointestinales y pulmonares, reznos nasales y ácaros de la sama.

#### Vía de administración:

Intramuscular.

#### Dosis:

Bovinos y ovinos: 1 mL/50 kg de peso corporal (200 µg de Doramectina/kg de peso).

#### Presentación:

Frasco con 500 mL.

**USO VETERINARIO**



### NOVOX®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-081

#### Fórmula:

Cada 100 mL contienen:  
Sulfóxido de Albendazol 17 g  
Vehículo cbp 100 mL

#### Indicaciones:

**NOVOX®:** Antihelmíntico especialmente indicado en el tratamiento de las infestaciones por parásitos gastrointestinales y pulmonares de bovinos (productores de carne y leche), ovinos y caprinos, causadas por las formas adultas, inmaduras, larvianas y huevecillos de nematodos, cestodos y trematodos, como son: *Haemonchus contortus*, *Ostertagia ostertagi*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Dyctiocaulus viviparus*, *Bunostomum phlebotomum*, *Nematodirus helveticus*, *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*, *Oesophagostomum radiatum*, *Trichuris ovis*, *Strongyloides papillosus*, *Moniezia spp.*, *Capilaria spp.* y *Fasciola spp.*

#### Vía de administración:

Subcutánea.

#### Dosis:

Administrar por vía subcutánea en la tabla del cuello 1 mL por cada 50 kg de peso corporal. En casos de *Fasciola spp.* y *Ostertagia* Tipo II inhibida, la dosis recomendada es de 2 mL por cada 50 kg de peso.

#### Presentación:

Frasco con 200 mL.

**USO VETERINARIO.**



## ● EQUIPOS E IMPLANTES

### MEGACLOX® BG 6

Acetato de Trenbolona 40 mg y 17β Estradiol 8 mg

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-244

#### Fórmula:

Cada implante contiene:  
Acetato de Trenbolona 40 mg  
17β Estradiol 8 mg  
Excipiente cbp un implante

#### Indicaciones:

**MEGACLOX® BG 6** promueve el crecimiento, favoreciendo la síntesis de proteínas, incrementando la ganancia diaria de peso, mejorando la conversión alimenticia y reduciendo el período de iniciación en la engorda de bovinos (productores de carne): hembras y machos a partir de los 6 meses de edad, en condiciones de pastoreo o en corral.

#### Dosis:

Un implante por animal. Su acción permanece de 120-140 días.

#### Contenido neto:

1 cartucho con 10 implantes de 2 comprimidos.

**USO VETERINARIO**



### MEGACLOX® CR200

Acetato de Trenbolona 200 mg y 17β Estradiol 20 mg

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-247

#### Fórmula:

Cada implante contiene:  
Acetato de Trenbolona 200 mg  
17β Estradiol 20 mg  
Excipiente cbp un implante

#### Indicaciones:

**MEGACLOX® CR200** promueve el crecimiento, favoreciendo la síntesis de proteínas, incrementando la ganancia diaria de peso, mejorando la conversión alimenticia y reduciendo el período de finalización en la engorda de bovinos (productores de carne): hembras y machos castrados en corral.

#### Dosis:

Un implante por animal. Su acción permanece de 120-140 días.

#### Contenido neto:

2 cartuchos, cada cartucho con 10 implantes de 10 comprimidos.

**USO VETERINARIO**



### MEGACLOX® FG+

Acetato de Trenbolona 140 mg y 17β Estradiol 20 mg

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-245

#### Fórmula:

Cada implante contiene:  
Acetato de Trenbolona 140 mg  
17β Estradiol 20 mg  
Excipiente cbp un implante

#### Indicaciones:

**MEGACLOX® FG +** promueve el crecimiento, favoreciendo la síntesis de proteínas, incrementando la ganancia diaria de peso, mejorando la conversión alimenticia y reduciendo el período de finalización en la engorda de bovinos (productores de carne) machos y hembras de corral.

#### Dosis:

Un implante por animal. Con duración de 70-90 días.

#### Contenido neto:

2 cartuchos, cada cartucho con 10 implantes de 7 comprimidos.

**USO VETERINARIO**



## ● EQUIPOS E IMPLANTES

### FLEBOTEK® VET Sin aguja

Indicaciones:  
Equipo para venoclisis, desechable.  
Presentación:  
1 pieza.  
USO VETERINARIO



### FLEBOTEK® VET CON ESPIRAL

Indicaciones:  
Equipo para venoclisis, desechable.  
Presentación:  
1 pieza.  
USO VETERINARIO



### FLEBOTEK® VET Normogotero

Indicaciones:  
Equipo desechable para administración de soluciones.  
Presentación:  
1 pieza.  
USO VETERINARIO



## ● ESTIMULANTES DE APETITO Y HEMATOPOYÉTICOS

### CALCIOSOL® FORTE

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-128

Fórmula:  
Cada 100 mL contienen:  
Gluconato de calcio 53.65 g  
Fosfato Dibásico de sodio 0.65 g  
Vehículo cbp 100 mL

Indicaciones:

CALCIOSOL® FORTE es una solución estéril de Gluconato de calcio al 53.65%, complementado con fósforo, usada en bovinos (productores de carne y leche), ovinos y caprinos.

Eficaz para el tratamiento de deficiencias del calcio relacionadas al parto y la lactancia, raquitismo y deficiencias nutricionales.

Está indicado en la hipocalcemia o fiebre de hembras parturientas y en problemas relacionados como paresias o tetanias de la preñez, eclampsia, osteomalacia y raquitismo. Intoxicaciones por metales pesados. Envenenamiento por piquetes de insectos o mordeduras de serpiente.

De utilidad en algunas alergias y problemas de coagulación de la sangre y en general en deficiencias nutricionales de calcio.

Asimismo, está indicado en trastornos de la conducción nerviosa y regulación del tono muscular; como en la debilidad de contracciones uterinas en el parto.

Vía de administración:

La administración debe hacerse por vía intravenosa lenta.

Pueden emplearse las vías intramuscular o subcutánea diluyendo el producto.

Dosis:

Bovinos: de 90 a 115 mL.

Ovinos y caprinos: De 22 a 70 mL.

Presentación:

Frasco con 100 mL.

USO VETERINARIO



### CAROSEN® C

Fórmula:

Cada 200 g contienen:  
Vitamina A 5'000,000 U.I.  
Vitamina D3 500,000 U.I.  
Vitamina E 5,000 U.I.  
Vitamina B1 0.750 g  
Vitamina B2 2 g  
Vitamina B6 1.750 g  
Vitamina B12 0.005 g  
Vitamina K3 5 g

Nicotinamida 12.500 g  
Pantotenato de Calcio 6.750 g  
Ácido Fólico 0.400 g  
Biotina 0.020 g  
Vitamina C 125 g  
Excipiente c.b.p. 200 g

Indicaciones:

Multivitámico concentrado hidrosoluble, adicionado con vitamina C, estable en agua de bebida para utilizarse en bovinos (productores de leche y carne) en estado de estrés o enfermedad; o bien como complemento para su óptimo rendimiento. Además mejora la respuesta inmunitaria.

Vía de administración:

Oral, disuelto en el agua de bebida.

Dosis:

Administrar 200 g de CAROSEN® C por cada 1.000 litros de agua de bebida en animales sujetos a estrés o enfermedad por un periodo de 5 a 7 días.

Recomendaciones:

Bovinos: Durante la primera semana de vida, una semana antes y después del destete. Como coadyuvante antes y después de cualquier manejo.

Presentación:

Cubeta con 25 sobres de 200 g c/u

USO VETERINARIO





## ● ESTIMULANTES DE APETITO Y HEMATOPOYÉTICOS

### COMPLENAY® B12 Polvo

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-057

#### Fórmula:

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Cada 100 g contienen:       |          |
| Sulfato de mefentermina     | 0.5 g    |
| Clorhidrato de Tiamina      | 0.5 g    |
| Riboflavina 5 fosfato       | 0.1 g    |
| Clorhidrato de Piridoxina   | 0.070 g  |
| Cianocobalamina             | 0.500 mg |
| Nicotinamida                | 1 g      |
| Glicerofosfato de calcio    | 3.5 g    |
| Glicerofosfato de sodio     | 7 g      |
| Glicerofosfato de manganeso | 0.350 g  |
| Cloruro de potasio          | 0.420 g  |
| Excipiente cbp              | 100 g    |

#### Indicaciones:

Complemay® B12 es un polvo soluble que contiene vitaminas del Complejo B, minerales y Sulfato de mefentermina. Ayuda a la recuperación y mejora el estado general de los bovinos (productores de carne y leche) por sus efectos estimulantes y reconstituyentes.

Es útil en las convalecencias de todas las enfermedades graves, después de pérdidas sanguíneas, distocia al parto, anemias de toda naturaleza; en estados depresivos originados por estrés, mejora el estado de los animales durante las épocas de gestación, lactancia, engorda, crianza y en épocas de servicio.

#### Vía de administración:

Oral.

#### Dosis:

1 g por cada litro de agua de bebida. Los animales deberán beber exclusivamente el agua medicada por un periodo de 3 a 5 días.

#### Presentación:

2 kg.

#### USO VETERINARIO



### COMPLENAY® MO

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-155

#### Fórmula:

Aceite de hígado de bacalao genuino, filtrado a bajas temperaturas, esterilizado y estabilizado natural y artificialmente con Tocoferol (Vitamina E) y BHT. Contiene no menos de 750 U.I./g de vitamina A, no menos de 75 U.I./g de vitamina D y una proporción de ácidos grasos poliinsaturados (5 y 6 dobles enlaces) del orden del 15 al 30% con respecto al total de ácidos grasos.

#### Indicaciones:

Complemay® MO es un estimulante metabólico, mejora la conversión alimenticia, acelera la engorda, es un suplemento nutricional, actúa como adyuvante en el tratamiento de enfermedades parasitarias e infecciosas. Es un reconstituyente y revigorizante orgánico (ver instructivo anexo).

#### Vía de administración:

Intramuscular o intraruminal.

Por ser un producto de aplicación parenteral se recomienda seguir procedimientos asépticos.

#### Dosis:

|            |       |
|------------|-------|
| Bovinos:   |       |
| •Adultos:  | 10 mL |
| •Terminos: | 5 mL  |

#### Presentación:

Frasco con 100 y 500 mL.

#### USO VETERINARIO



### CALCIOSOL® CON FIJADOR Y DEXTROSA

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-001

#### Fórmula:

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Cada 100 mL contienen:                          |          |
| Gluconato de calcio monohidratado equivalente a | 12.300 g |
| de Gluconato de calcio anhidro                  |          |
| Levulinato de calcio                            | 2.200 g  |
| Sacarato de calcio                              | 0.400 g  |
| Glucosa anhidra                                 | 15 g     |
| Sulfato de Efedrina                             | 4.25 mg  |
| Vehículo cbp                                    | 100 mL   |

#### Además un frasco ampula conteniendo:

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Calciferol              | 3.125 mg     |
| equivalente a           |              |
| de vitamina D2          | 125,000 U.I. |
| Aceite de sésamo c.b.p. | 5 mL         |

#### Indicaciones:

Eficaz para el tratamiento de deficiencias del calcio relacionadas al parto y lactancia (hipocalcemia o fiebre de leche), raquitismo y deficiencias nutricionales.

Recalcificante y reconstituyente general para bovinos (productores de leche y carne) y ovinos. Coadyuvante en el tratamiento de las intoxicaciones causadas por alimentos contaminados o en mal estado.

#### Vía de administración:

La aplicación de Calciosol® debe ser por vía intravenosa exclusivamente, teniendo la precaución de inyectarlo muy lentamente y a la temperatura cercana a 38°C. El fijador (vitamina D2) debe aplicarse por separado por vía intramuscular, exclusivamente.

#### Dosis:

| Especie animal | Calciosol   | Fijador Vitamina D2 |
|----------------|-------------|---------------------|
| Bovinos        | 250-500 mL  | 2.5-5 mL            |
| Ovinos         | 50 - 100 mL | 0.5-1 mL            |

#### Presentación:

Frasco con 500 mL y fijador de 5 mL.

#### USO VETERINARIO



### BEPLENOVAX® VET

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-149

#### Fórmula:

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Cada 100 mL contienen:    |        |
| Glucosa                   | 5 g    |
| Clorhidrato de Tiamina    | 10 mg  |
| Riboflavina               | 4 mg   |
| Nicotinamida              | 50 mg  |
| Clorhidrato de Piridoxina | 5 mg   |
| Vehículo cbp              | 100 mL |

#### Indicaciones:

BEPLENOVAX® VET es un reconstituyente multivitamínico enriquecido con glucosa, para una rehidratación inmediata y recuperación de vitaminas y energéticos. Se indica en bovinos (productores de carne y leche) y ovinos para la recuperación post-quirúrgica, estados de debilidad, diarrea y estrés.

Vía de administración: intravenosa, subcutánea, intraperitoneal.

#### Dosis:

Bovinos y ovinos: 2 a 10 mL/kg de peso al día.

Una dosis practica en bovinos: son de 1 a 2 litros por animal.

#### Presentación:

1000 mL.

#### USO VETERINARIO



### COMPLENAY® B12 ELÍXIR

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-056

#### Fórmula:

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Cada 100 mL contienen:         |        |
| Sulfato de Mefentermina        | 67 mg  |
| Fosfato sódico de Riboflavina  | 14 mg  |
| Clorhidrato de Piridoxina      | 10 mg  |
| Clorhidrato de Tiamina         | 70 mg  |
| Cianocobalamina                | 67 µg  |
| Nicotinamida                   | 140 mg |
| Glicerofosfato de sodio        | 720 mg |
| Glicerofosfato de potasio      | 100 mg |
| Glicerofosfato de calcio       | 500 mg |
| Glicerofosfato de manganeso    | 50 mg  |
| Saborizantes y vehículo c.b.p. | 100 mL |

#### Indicaciones:

Complemay® B12 Elíxir, es un concentrado multivitamínico indicado para estimular a animales de alto rendimiento en sus diferentes etapas de desarrollo, lo cual se refleja en una mejor respuesta al medio ambiente, mejor ganancia de peso, fuerza y resistencia. Fortifica a animales enfermos y/o convalecientes y proporciona tiempos de recuperación más cortos. Util para contrarrestar los efectos adversos del estrés sobre la productividad animal o trabajo.

#### Vía de administración:

Oral, solo o diluido en el agua de bebida.

#### Dosis:

En cabritos y corderos: Administrar 1 mL al nacimiento. Al destete para reducir el efecto del estrés administrar 2 mL. En animales convalecientes administrar 2 a 5 mL por cada 10 kg de peso en toma directa, de 2 a 3 veces al día durante 3 a 5 días.

En bovinos, ovinos y caprinos: 1 a 5 mL por cada 10 kg de peso, en toma directa o humedeciendo la ración alimenticia, 2 a 3 veces al día durante 3 a 5 días.

#### Presentación:

100 mL y 3.5 L.

#### USO VETERINARIO



## ● ESTIMULANTES DE APETITO Y HEMATOPOYÉTICOS

### SEBA ADE®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-087

#### Fórmula:

Cada mL contiene:  
Vitamina A 5,000 U.I.  
Vitamina D-3 75,000 U.I.  
Vitamina E 50 U.I.  
Vehículo cbp 1 mL

#### Indicaciones:

SEBA ADE® está indicado para la prevención y tratamiento de deficiencias de las vitaminas A, D<sub>3</sub> y E en bovinos (productores de carne y leche), ovinos y caprinos, en épocas de sequía y escasez de pasto, en la disminución de la producción de leche, lana y carne.

SEBA ADE® permite la adecuada regulación de los niveles de calcio y fósforo para el desarrollo normal de los huesos y evitar problemas de raquitismo, osteoporosis y osteomalacia.

SEBA ADE® previene la presentación de trastornos metabólicos como la enfermedad del músculo blanco.

En ganado de engorda SEBA ADE® contribuye a incrementar la ganancia diaria de peso y mejorar la conversión alimenticia.

SEBA ADE® sirve como coadyuvante en problemas de infertilidad y baja fecundidad, y trastornos del metabolismo asociados a deficiencias de estas vitaminas. En sementales SEBA ADE® interviene en la función reproductiva estimulando la espermatogénesis.

En estados de estrés causados por cambios de clima, aglomeración, transporte, vacunación, castración. SEBA ADE® ayuda a mejorar la respuesta inmune humoral y celular.

#### Vía de administración:

Bovinos: intramuscular.

Ovinos y caprinos: intramuscular y subcutánea.

#### Dosis:

Bovinos: 2-6 mL,

Ovinos y caprinos: 0.5-3 mL

#### Presentación:

100 mL y 500 mL

#### USO VETERINARIO



### PONADE®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-228

#### Fórmula:

Cada mL contiene:  
Selenito de sodio 10.95 mg  
equivalente a 5 mg de Selenio  
Vitamina E 50 mg  
Vehículo cbp 1 mL

#### Indicaciones:

PONADE® se usa para la prevención y tratamiento de las deficiencias de selenio y vitamina E en el ganado bovino, caprino y ovino.

Así como en el tratamiento y prevención de la enfermedad del músculo blanco, como auxiliar en cuadros de debilidad muscular, como antioxidante y como coadyuvante en la prevención de problemas clínicos como mastitis, metritis y retención placentaria, así como en el síndrome MMA (mastitis, metritis y agalactia).

PONADE® coadyuva a mejorar los parámetros reproductivos, reduciendo los días abiertos, incrementando la fertilidad, reduciendo abortos y mejorando la sobrevivencia del neonato.

#### Vía de administración:

Intramuscular o subcutánea.

#### Dosis:

Bovinos adultos y novillos: 1 mL por cada 50 kg de peso corporal.

Becerras: 1 mL por cada 100 kg al destete.

Ovinos y caprinos: 1 mL/100 kg de peso corporal.

#### Presentación:

Frasco con 250 mL.

#### USO VETERINARIO



### FERRITÓN® 200

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-083

#### Fórmula:

Cada mL contiene:  
Hierro Dextrán equivalente a 200 mg  
de Hierro  
Vehículo cbp 1 mL

#### Indicaciones:

FERRITÓN® 200 es una solución de Hierro Dextrán de baja viscosidad, rápida absorción y total aprovechamiento. Indicada para la prevención y el tratamiento de la anemia por carencia o deficiencia de hierro en los bovinos (productores de leche y carne).

#### Vía de administración:

Intramuscular profunda.

#### Dosis:

Para la prevención de la anemia en bovinos hasta los 3 meses de edad aplicar 5 mL durante la 1ª semana, repetir la dosis en la 4ª o 6ª semana. Para el tratamiento de la anemia administrar 5 mL por cada 100 kg de peso.

#### Presentación:

12 frascos con 100 mL c/u

#### USO VETERINARIO



### VITABECID®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-203

#### Fórmula:

Cada mL contiene:  
Butafosfán 100 mg  
Vitamina B-12 0.05 mg  
Vehículo cbp 1 mL

#### Indicaciones:

VITABECID® está indicado en bovinos (productores de carne y leche), ovinos y caprinos como reconstituyente general en casos de estrés, ejercicio excesivo, cansancio, resistencia reducida y como un tónico en casos de debilidad, anemia secundaria y resfriado; apoya adicionalmente la fisiología del músculo, el tratamiento de la infertilidad, tetania y paresia como un adjunto a la terapia con calcio y magnesio. En el tratamiento de animales sanos se usa para mejorar el estado general de los animales, para vacas lecheras sometidas al esfuerzo intenso de la lactancia y para mejorar la eficacia reproductiva de hembras y machos.

#### Vía de administración:

Subcutánea, intramuscular o endovenosa.

#### Dosis:

Bovinos adultos: 10-20 mL

Potros y terneros: 5-12 mL

Ovinos y caprinos adultos: 2.5-5 mL

Corderos y cabritos: 1.5-2.5 mL

Repita diariamente si se requiere.

En animales sanos la mitad de la dosis, y en caso necesario repetirla con intervalos de 1 a 2 semanas.

#### Presentación:

Frasco con 100 mL

#### USO VETERINARIO





## HORMONALES Y DIURÉTICOS

### ENERCOL®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-087

#### Fórmula:

Cada frasco ampula contiene:  
Maleato de Ergonovina 0.018 g  
Vehículo cbp 30 mL

#### Indicaciones:

ENERCOL®: Indicado en bovinos productores de carne y leche, ovinos y caprinos en las retenciones de las membranas fetales (retención placentaria), para lograr el vaciamiento de líquidos patológicos acumulados en el útero (piómetra) y para estimular las contracciones del útero cuando se presente inercia uterina durante el parto (siempre que el cuello de la matriz se encuentre abierto y no exista obstrucción por mal posición del producto), la cual deberá ser corregida antes del tratamiento.

#### Vía de administración:

Intramuscular profunda.

#### Dosis:

Bovinos: 10 mL.

Ovinos y caprinos: 5 mL.

La dosis se puede repetir 1 ó 2 veces, con 24 horas de intervalo.

#### Presentación:

Frasco ampula con 30 mL.

USO VETERINARIO



### HENEXAL® VET

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-018

#### Fórmula:

Cada mL contiene:  
Furosemida 50 mg  
Vehículo cbp 1 mL

#### Indicaciones:

Indicado para aumentar la diuresis en bovinos (productores de leche y carne), con edema pulmonar, cerebral, edemas locales y de la ubre, y en ascitis.

#### Vía de administración:

Intravenosa o intramuscular.

#### Dosis:

La dosis media es de 1 a 3 mg/kg.

#### Presentación:

Frasco con 10 mL.

USO VETERINARIO



### OXITOPISA®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-01

#### Fórmula:

Cada mL contiene:  
Oxitocina 20 U.I.  
Vehículo cbp 1 mL

#### Indicaciones:

OXITOPISA®: Hormona utilizada en la retención placentaria, auxiliar en hemorragias post-parto, acelera el parto normal, estimula la motilidad del útero y favorece la secreción láctea, en las vacas (productoras de carne y leche), ovejas y cabras.

#### Vía de administración:

Intramuscular, intravenosa o subcutánea.

#### Dosis:

Vacas: 5 mL

Ovejas y cabras: 3 mL

#### Presentación:

Frasco con 100 mL y 250 mL.

USO VETERINARIO



### HORPROGES®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-214

#### Fórmula:

Cada mL contiene:  
Progesterona 50 mg  
Vehículo cbp 1 mL

#### Indicaciones:

HORPROGES®: Hormona progestágena útil en los bovinos (productores de carne y leche) y ovinos, para:

- La prevención y tratamiento del aborto causado por estrés.

- Combatir la esterilidad funcional (hembras repetidoras).

- Ayudar en el control de los calores frecuentes, por exceso de estrógenos en hembras ninfómanas o machorras.

- Coadyuvar en el tratamiento de prolapsos vaginales.

- Favorecer el desarrollo de la glándula mamaria.

- Influir en el engrosamiento del endometrio y proliferación de las glándulas uterinas, favoreciendo la implantación y nidación del óvulo fecundado.

- Disminuir la motilidad uterina durante el periodo de implantación y gestación, facilitando el desarrollo normal de la preñez.

- Asegurar las condiciones necesarias para la secreción láctea.

- En terapia combinada sirve para tratar el anestro.

Vía de administración: Intramuscular profunda.

#### Dosis:

Bovinos (carne y leche): 2.5 a 5 mL.

Ovinos: 1 a 2 mL.

Estas dosis pueden variar a criterio del médico veterinario.

#### Presentación:

Frasco con 10 mL.

USO VETERINARIO



### INDUPAR®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-220

#### Fórmula:

Cada mL contiene:  
D-(+)-Cloprostenol sódico equivalente a 0.075 mg  
D-(+)-Cloprostenol 1 mL

#### Indicaciones:

INDUPAR®: es un Cloprostenol, análogo sintético de la Prostaglandina F2 alfa útil para el tratamiento de los cuadros reproductivos en los que se requiera la lisis del cuerpo lúteo: Vacas: Anestro y subestro, cuerpos lúteos quísticos y quistes luteales, piómetra y endometritis crónica, regulación y sincronización del estro, interrupción de la gestación, inducción del parto.

#### Vía de administración:

Intramuscular.

#### Dosis:

Vacas: 2 mL (150 µg)

#### Presentación:

Frasco con 20 mL.

USO VETERINARIO



### RELINA® 500

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-218

#### Fórmula:

Cada 5 mL contienen:  
Gonadorelina acetato equivalente a 500 mcg  
de Gonadorelina 5 mL

#### Indicaciones:

RELINA® 500: Controla la producción y secreción de la hormona luteinizante (LH) y de la hormona folículo estimulante (FSH) en bovinos (productores de carne y leche). Usar en el momento de la inseminación artificial para inducir la ovulación y mejorar la tasa de concepción; aplicándola 12 o 14 días posparto mejora la fertilidad en el puerperio. También se usa en el tratamiento de quistes ováricos foliculares.

#### Vía de administración:

Intramuscular.

#### Dosis:

Tratamiento de quistes ováricos 5 mL

Retraso en la ovulación 2.5 mL

Reinicio de la actividad ovárica en el periodo de posparto 2.5 mL

Sincronización de la ovulación en los programas de inseminación a tiempo fijo (programa de Ovsynch). 1 mL.

#### Presentación:

Frasco con 50 mL.

USO VETERINARIO



## ● PREPARADOS DE USO EXTERNO

### TOPAZONE® NF

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-237

#### Fórmula:

Cada 100 g contienen:  
Florfenicol 0.6 g  
Agentes dispersantes inertes y propelente cbp 100 g

#### Indicaciones:

TOPAZONE® NF: Es eficaz para la prevención y tratamiento de las infecciones que pueden presentarse al realizar los siguientes procedimientos:

- Descorné y marcado del ganado
- Corte de ombligo y rabos
- Castración
- Cirugía
- Heridas en general

Además al prevenir y controlar las infecciones cutáneas, sirve como coadyuvante a una mejor y más rápida cicatrización de la lesión.

TOPAZONE® NF es el tratamiento de elección para solucionar, prevenir y reducir la incidencia de la queratoconjuntivitis infecciosa bovina u ojo rosado (Pink eye) causada por *Moraxella bovis*. También es eficaz en cualquier infección inespecífica de los ojos en el ganado.

Actúa sobre las principales bacterias aisladas en las heridas como: *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus spp.*, *Acinetobacter spp.*, *Proteus mirabilis* y *Pseudomonas spp.*

#### Vía de administración:

Tópica

Dosis: Agite bien el envase antes de usarlo, aplique a una distancia de 15 a 30 cm del área afectada hasta cubrirla totalmente, se recomienda una a dos aplicaciones al día, repitiendo el tratamiento hasta la completa recuperación.

#### Presentación:

400 mL

USO VETERINARIO



### FURACINE® NF

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-185

#### Fórmula:

Cada 100 mL contienen:  
Florfenicol 0.6 g  
Vehículo cbp 100 mL

#### Indicaciones:

Furacine® NF es una solución con acción antimicrobiana de amplio espectro para usarse en el tratamiento de: 1) infecciones del tracto genital y problemas de la fertilidad disminuida en las hembras de grandes especies, cuando dichos trastornos son causados por cepas de *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Streptococcus suis*, *Klebsiella spp.*, *Aeromonas spp.*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Pseudomonas spp.* o *Campylobacter jejuni* var *fetus* (antes llamada *Vibrio fetus*) entre otras, sensibles a la acción de los componentes de la formulación; 2) para la prevención o control de infecciones bacterianas superficiales de la piel.

#### Vía de administración:

Tópica o intrauterina.

#### Dosis:

Tratamiento: Administrar de 30 a 90 mL directamente en el útero del animal, por medio de una pipeta o jeringa con cánula 1 vez al día por 3 a 5 días. En heridas de la piel se puede utilizar directamente una cantidad suficiente sobre la herida después de haber realizado la limpieza y lavado de la misma.

#### Instrucciones de uso:

En infecciones bacterianas superficiales: aplicar la solución directamente sobre la herida o lesión. Para apósitos húmedos, puede diluirse con dos o tres partes de agua estéril o con solución salina fisiológica y aplicarse varias veces al día o dejarse un vendaje humedecido con la solución.

#### Presentación:

500 mL y 3.5 L.

USO VETERINARIO



## ● SOLUCIONES Y ELECTROLITOS

### AGUA ESTÉRIL PISA®

AUTORIZACIÓN S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-270

#### Fórmula:

Cada 100 mL contienen:  
Agua inyectable 100 mL

#### Indicaciones:

AGUA ESTÉRIL PISA® se indica como diluyente de medicamentos, de semen y para irrigación de cavidades, áreas quirúrgicas, heridas y limpieza de material e instrumental quirúrgico.

#### Dosis y vía de administración:

Como solución inyectable, la dosis y vía de administración varía de acuerdo a las instrucciones específicas de reconstitución o dilución del medicamento en que se pretenda utilizar y de las indicaciones del médico veterinario tratante.

La administración mediante irrigación es a través de la aplicación directa del agua sobre los tejidos y realizando aspiración suave. En este caso la dosis varía de acuerdo a la indicación terapéutica.

#### Presentación:

Frasco plástico 3 L.

USO VETERINARIO



### AMINOFOSCAL® VITAMINADO

(Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-053)

#### Fórmula:

Cada 250 mL contienen:

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gluconato de calcio       | 60 g   |
| Dextrosa anhidra          | 15 g   |
| Ácido bórico              | 12 g   |
| Hipofosfito de magnesio   | 1.8 g  |
| Aminoácidos esenciales    | 25 g   |
| Hidroxocobalamina         | 25 µg  |
| Clorhidrato de Tiamina    | 50 mg  |
| Fosfato de Riboflavina    | 20 mg  |
| Clorhidrato de Piridoxina | 50 mg  |
| Nicotinamida              | 250 mg |
| Dexpantenol               | 20 mg  |
| Vehículo cbp              | 250 mL |

#### Indicaciones:

AMINOFOSCAL® VITAMINADO se indica para la prevención y tratamiento de hipocalcémias, tetanias, paresias y parálisis antes, durante y después del parto; eclampsia, hipoglucemias, hipofosfatemias, estados de estrés, debilidad general, trastornos metabólicos y deficiencia de vitaminas del complejo B.

Todos los componentes de AMINOFOSCAL® VITAMINADO son elementos esenciales para el mejor funcionamiento y desarrollo del organismo animal. Por sus efectos reconstituyentes y estimulantes del sistema nervioso central, es de gran utilidad en la recuperación de los animales después de algunas enfermedades infecciosas y metabólicas.

#### Vía de administración:

Intramuscular, intravenosa y subcutánea.

#### Dosis:

Bovinos: 150 a 250 mL

Ovinos y caprinos: 15 a 30 mL

#### Presentación:

Frasco con 500 mL.

USO VETERINARIO





## SOLUCIONES Y ELECTROLITOS

### ELECTRODEX®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-121

#### Fórmula:

Cada 1,000 g contienen:  
Ácido Ascórbico 50 g  
Ácido Acetoxibenzoico 62.5 g  
(Ácido Acetilsalicílico)  
Cloruro de sodio 128 g  
Cloruro de potasio 128 g  
Excipiente cbp 1,000 g

#### Indicaciones:

ELECTRODEX®: se recomienda para bovinos (productores de carne y leche), ovinos y caprinos.

• Para el restablecimiento de los animales después de haber estado expuestos a deshidratación y estrés por: manejo, transporte, recepción, vacunaciones, castrado, destetado, reacomodo en corrales, cambios bruscos de temperatura y todos aquellos factores estresantes que desencadenen dicho proceso.

• En la prevención de estrés al realizar todos aquellos manejos que pueden ser considerados como factores estresantes.

• Así como para el restablecimiento del equilibrio hidrolítico en las especies destino.

#### Vía de administración:

Oral, disuelto en el agua de bebida


#### Dosis:

Bovinos, ovinos, caprinos: la dosis preventiva, terapéutica y antimerma es 1 g/1-2 litros de agua de bebida.

#### Presentación:

Cubeta con 10 kg.

#### USO VETERINARIO



### SOLUCIÓN CS PISA® 7.5%

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-102

#### Fórmula:

Cada 100 mL contienen:  
Cloruro de sodio 7.5 g  
Agua inyectable cbp 100 mL

#### El envase con 1000 mL contiene:

Sodio 1283 mEq  
Cloruro 1283 mEq

#### Indicaciones:

SOLUCIÓN CS PISA® 7.5% indicado en bovinos (productores de leche o carne) como restaurador del equilibrio hidroeletrolítico. Tratamiento de la depleción de sodio debido a diuresis excesiva o gastroenteritis. Como vehículo en la administración de medicamentos por venoclisis cuando es diluido a una concentración isotónica (100 mL diluidos con 733 mL de agua inyectable).

#### Vía de administración:

Intravenosa, teniendo la precaución de inyectarlo lentamente y a temperatura corporal.

#### Dosis:

Bovinos: De 100 a 200 mL por 100 kg de peso corporal repitiendo si es necesario a las 12 horas.

#### Presentación:

1000 mL

#### USO VETERINARIO



### SOLUCIÓN DX-50 PISA®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-011

#### Fórmula:

Cada 100 mL contienen:  
Glucosa 50 g  
Agua inyectable cbp 100 mL

#### Indicaciones:

Se usa como energético en estados hipoglucémicos, fiebre de leche, estados febriles, desnutrición, caquexia, acidosis, cetosis, shock y debilidad.

#### Vía de administración:

Intravenosa.

#### Dosis:

Bovinos: 250-500 mL

Ovinos: 150-300 mL

La dosis diaria de glucosa total depende de los requerimientos calóricos, la tolerancia a la glucosa y la respuesta metabólica y clínica de cada paciente.

#### Presentación:

500 mL

#### USO VETERINARIO



### SOLUCIÓN CS PISA®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-009

#### Fórmula:

Cada 100 mL contienen:  
Cloruro de sodio 0.9 g  
Agua inyectable cbp 100 mL

El envase con 500 mL 1000 mL contiene:

Sodio 77 mEq 154 mEq

Cloruro 77 mEq 154 mEq

#### Indicaciones:

SOLUCIÓN CS PISA®: se usa en bovinos (productores de leche y carne), borregos y cabras como restaurador del equilibrio hidroeletrolítico, para tratar la alcalosis hipoclorémica, en el manejo de la alcalosis metabólica, durante y después de la cirugía, como vehículo en la administración de medicamentos por venoclisis y en el tratamiento de la deficiencia de sodio debido a diuresis excesiva o gastroenteritis.

#### Vía de administración:

Intravenosa o intraperitoneal.

Dosis: De acuerdo al estado hidroeletrolítico, edad y peso corporal. (40 a 50 mL/kg de peso corporal cada 24 horas).

#### Presentación:

500 mL y 1000 mL

#### USO VETERINARIO



### SOLUCIÓN DX-5 PISA®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-008

#### Fórmula:

Cada 100 mL contienen:  
Glucosa 5 g  
Agua inyectable cbp 100 mL

#### Indicaciones:

SOLUCIÓN DX-5 PISA®: Úsese siempre que sea necesario administrar agua libre de sodio. En deshidratación hipertónica (hipernatremia). En deficiencia de agua que no puede ser suplida con otras soluciones hidroeletrolíticas. Como energético en los estados hipoglucémicos. Como vehículo en aplicación de medicamentos por venoclisis y en los casos en que se requiere mantener una vena permeable.

#### Vía de administración:

Intravenosa por venoclisis.

#### Dosis:

De acuerdo al estado hidroeletrolítico, edad y peso corporal del paciente. (40 a 50 L/kg de peso corporal cada 24 horas).

#### Presentación:

500 mL y 1000 mL

#### USO VETERINARIO



## SOLUCIONES Y ELECTROLITOS

### ELECTRODEX® GLN Pediátrico

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-289

#### Fórmula:

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Cada 180 g contienen:                                  |       |
| Dextrosa anhidra                                       | 138 g |
| Citrato de sodio<br>(equivalente a 2.62 g de sodio)    | 9.8 g |
| Glutamina                                              | 9 g   |
| Cloruro de sodio<br>(equivalente a 2.40 g de sodio)    | 6.1 g |
| Cloruro de potasio                                     | 4.5 g |
| Acetato de magnesio                                    | 2.5 g |
| Cloruro de calcio                                      | 2 g   |
| Propionato de sodio<br>(equivalente a 0.47 g de sodio) | 2 g   |
| Acetato de sodio<br>(equivalente a 0.36 g de sodio)    | 1.3 g |
| Excipiente cbp                                         | 180 g |



#### Indicaciones:

ELECTRODEX® GLN Pediátrico: es una mezcla energética que funciona como una fuente de alimentación dietética de electrolitos, aminoácidos (Glutamina) y carbohidratos fácilmente asimilables.

La Glutamina es el sustrato principal para el transporte de nitrógeno a los tejidos y facilita la excreción renal de nitrógeno. Funciona como sustrato energético esencial para las células proliferativas como enterocitos y linfocitos. A nivel del sistema nervioso central la Glutamina juega un papel importante en la desintoxicación de amoníaco, también se emplea en la biosíntesis de Glutión, que tiene un papel muy importante en los mecanismos antioxidantes.

Indicado para estabilizar el equilibrio del agua y electrolitos en becerros. Se destina al uso en casos de riesgo de alteraciones digestivas (diarrea) o para la rápida recuperación de los animales después de dichas alteraciones.

#### Vía de administración:

Oral, disuelto en el agua de bebida.

#### Dosis:

Beceros:

Prepare una solución nueva antes de cada dosificación, mezclando el contenido de un sobre (180 g) en 2 litros de agua tibia.

El producto puede administrarse subsecuentemente por otros 4 días (hasta un total de 7 días) a una dosis de 1 litro de solución y 1 litro de alimento sustituto de leche dos veces al día. De ahí en adelante reanude la alimentación normal.

#### Presentación:

Caja con 5 sobres de 180 g c/u

#### USO VETERINARIO



### SOLUCIÓN HT PISA®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-018

#### Fórmula:

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Cada 100 mL contienen: |         |
| Cloruro de sodio       | 0.600 g |
| Cloruro de potasio     | 0.030 g |
| Cloruro de calcio      | 0.020 g |
| Lactato de sodio       | 0.310 g |
| Agua inyectable cbp    | 100 mL  |

#### Miliequivalentes por litro:

|         |     |
|---------|-----|
| Sodio   | 130 |
| Potasio | 4   |
| Calcio  | 3   |
| Cloruro | 109 |
| Lactato | 28  |

#### Indicaciones:

SOLUCIÓN HT PISA®: Se usa en deshidratación por diarrea severa, acidosis metabólica, falta de agua durante 3 días o más, secuestro de líquidos por obstrucción intestinal, ejercicio excesivo o prolongado.

#### Vía de administración:

Subcutánea, intravenosa e intraperitoneal.

#### Dosis:

De acuerdo al estado hidroelectrolítico, edad y peso corporal. (40 a 50 mL/kg de peso corporal cada 24 horas).

#### Presentación:

Bolsa de 2500 mL y 5000 mL y frasco de 500 mL y 1000 mL.

#### USO VETERINARIO



## TERAPIA APARATO DIGESTIVO

### NF 180® ST

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-153

#### Fórmula:

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Cada bolo contiene: |          |
| Sulfatiazol sódico  | 2,500 mg |
| Trimetoprim         | 1,000 mg |
| Excipiente cbp      | 1 bolo   |

#### Indicaciones:

NF 180® ST está indicado en el tratamiento de diarreas, gastroenteritis, colisepticemia, bronconeumonía, poliartritis, difteria de los terneros e infecciones del ombligo, ocasionadas por gérmenes sensibles al Sulfatiazol y al Trimetoprim.

La fórmula del NF 180® ST permite una liberación lenta del Trimetoprim, prolongando hasta por 24 horas el efecto sinérgico de la combinación entre el Sulfatiazol y Trimetoprim, logrando con ello una alta eficacia.

#### Vía de administración:

Oral.

#### Dosis:

Administrar 1 a 2 bolos al día, preferentemente durante 3 a 5 días.

#### Presentación:

200 bolos.

#### USO VETERINARIO



### STOP-ON®

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-078

#### Fórmula:

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Cada 100 mL contienen:                                     |         |
| Sulfametoxazol                                             | 2.500 g |
| Trimetoprim                                                | 0.500 g |
| Sulfato de Neomicina<br>equivalente a<br>de Neomicina base | 0.725 g |
| Caolín coloidal                                            | 10 g    |
| Pectina cítrica                                            | 0.500 g |
| Metilbromuro de Homatropina                                | 0.010 g |
| Vehículo cbp                                               | 100 mL  |

#### Indicaciones:

Stop-On® es una suspensión antidiarreica con acción antimicrobiana de amplio espectro y antiespasmódica, indicado para el tratamiento de las diarreas infecciosas agudas y subagudas, causadas por gérmenes susceptibles a la fórmula de Stop-On®. La combinación de los principios activos de Stop-On® actúa de manera rápida e integral.

#### Vía de administración:

Oral.

#### Dosis:

Bovinos (beceros, productores de carne y leche): 60 a 120 mL; cada 12 horas por 1 a 3 días.

Ovinos y caprinos: 10 a 30 mL; cada 12 horas por 1 a 3 días.

#### Presentación:

10 frascos con 60 mL

12 frascos con 250 mL

#### USO VETERINARIO



## PRODUCTOS DE LANZAMIENTO

### SELECTUR® EXTRA

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-282

#### Fórmula:

Cada mL contiene:  
Ceftiofur cristalino ácido libre

200 mg  
1 mL

#### Vehículo cbp

#### Indicaciones:

Antimicrobiano de amplio espectro, con acción bactericida, se indica en el tratamiento de la Enfermedad Respiratoria Bovina causadas por pasteurelosis y neumonía asociadas a *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* e *Histophilus somni*; En el tratamiento de Pododermatitis Infecciosa Bovina o garrar asociada a *Fusobacterium necrophorum* y *Porphyromonas levii* en bovinos, así como en el tratamiento y prevención de metritis aguda.

#### Dosis y vía de administración:

Aplicación exclusiva para bovinos.

Administración por vía subcutánea en la cara posterior de la oreja, administración única a una dosis de 6.6 mg de Ceftiofur cristalino ácido libre por kg de peso corporal (equivalente a 1 mL por cada 30 kg de peso).

No administrar más de 10 mL en un solo sitio de aplicación.

#### Presentación:

Frasco con 100 mL

#### USO VETERINARIO



### BASETYL® MAX NF

Reg. SAGARPA Q-7833-311

#### Fórmula:

Cada mL contiene:  
Florfenicol

20.0 g  
20.0 g  
100.0 mL

#### Vehículo cbp

#### Indicaciones:

Combinación antibiótica con amplio margen de acción que lo hace ideal contra bacterias Gram positivas, Gram negativas y agentes micoplásmicos, causantes de las principales enfermedades respiratorias y digestivas de los porcinos y bovinos.

#### Dosis y vía de administración:

Cerdos y bovinos (productores de carne y ganado lechero en periodo seco): la dosis recomendada de Tilosina y Florfenicol es de 10 mg/kg de peso, equivalente a 1 mL por cada 20 kg de peso.

#### Presentación:

Caja con un frasco con 100 y 250 mL

#### USO VETERINARIO



## ● CONTROL DE VECTORES

### SINATAQ®

Insecticida y/o acaricida concentrado emulsionable  
RSCO-URB-INAC-111-14-009-21.12

#### Fórmula:

Cipermetrina 21.12 %  
Butóxido de Piperonilo 7 %  
Vehículo cbp 100 %

#### Descripción:

Insecticida de amplio espectro de actividad. Puede usarse dentro y alrededor de todo tipo de instalaciones y estructuras.

#### Uso:

Insectos voladores y rastreros.

Dosis: 5 a 10 mL/litro de agua según el nivel de infestación.

#### Forma de aplicación:

Aspersión, termonebulización y nebulización.

#### Presentaciones:

Envase plástico 1 L.  
Envase plástico 100 mL.



### ZIROLARV®

Larvicida en polvo soluble.

REG. RSCO -PEC-INAC-0173-314-003-053

#### Fórmula:

Ciromazina 52.5 %  
Antiapelmazante y vehículo 75.5 %

#### Descripción:

Zirolarv® es un larvicida hecho a base de Ciromazina altamente efectivo para controlar larvas de todo tipo: de moscas y mosquitos. Altamente seguro para porcinos, bovinos y aves. Evita el desarrollo de las larvas de moscas que afectan en la producción animal como: mosca doméstica (*Mosca domestica*), mosca del cuerno (*Haematobia irritans*), mosca de establo (*Stomoxys calcitrans*), pequeña mosca doméstica (*Fannia canicularis*).

#### Uso:

Pecuario

Dosis: 80 g por cada 20-60 litros de agua para tratar 80 m² de estiércol y/o superficies con población de larvas.

#### Forma de aplicación:

Aspersión y riego.

#### Presentaciones:

Tarro con 250 g.



### FIST® GEL

Cucarachicida cebo en gel

RSCO-DOM-INAC-174-309-092-0.050

#### Fórmula:

Abamectina 0.05 %  
Vehículo cbp 99.95 %

#### Descripción:

Cucarachicida formulado como cebo en gel.

Presenta un excelente efecto residual que contiene potentes atrayentes específicos. Es fácil de aplicar, pues se adapta a cualquier tipo de superficie y no se endurece como otros en el mercado.

#### Uso:

Todo tipo de instalación.

Dosis: Aplique en forma de puntos, sobre grietas o hendiduras donde observe rastros o evidencia de cucarachas.

#### Presentaciones:

Jeringa con 30 g.



### TNK Enzym®

Ectoparasitocida natural

Reg. SAGARPA Q-9050-001

#### Fórmula:

Cada mL contiene:  
Aceites Naturales a base de Neem 2 %  
Quitinasa 38 %  
Vehículo cbp 100 %

#### Descripción:

TNK Enzym® es un repelente orgánico de ectoparásitos, considerado garrapaticida natural de uso externo, elaborado a base de aceites naturales y enzimas de origen orgánico, indicado para el control y prevención de ectoparásitos.

#### Uso:

Aves, bovinos, cerdos, equinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos.

#### Dosis:

10 mL de TNK Enzym®/L de agua, una vez obtenida la dilución puede aplicarse de 0.5 a 1 litro sobre el animal de acuerdo al grado de infestación.

#### Forma de aplicación:

Por aspersión.

#### Presentaciones:

Envase plástico de 1 L y 5 L.





**bio  
seguridad**

**Salud animal  
Bienestar humano®**

## ● CONTROL DE VECTORES


### TOTENFLI®

Mosquicida en cebo granulado  
RSCO-PEC-INAC-0199-381-420-001

**Fórmula:**  
Imidacloprid 1.0%  
Z-9 tricosene

**Descripción:**  
Insecticida granulado con ingredientes de primera calidad, los cuales dan un excelente resultado en el control de moscas con aparato bucal esponjoso chupador (ej. *Musca domestica*). Puede ser utilizado en cualquier tipo de instalación pecuaria.

**Forma de aplicación:**  
-Esparcido (voleo)  
-Con brocha (pintado)  
-Aspersión  
-Sobre recipientes o adherido  
**Dosis:** 1 mg/m<sup>2</sup>  
**Presentaciones:**  
Tarro de 1 kg  
Tarro de 2 kg.



### SINATAQ® 40

Insecticida y/o acaricida polvo humectable  
RSCO-URB-INAC-111-308-002-40

**Fórmula:**  
Cipermetrina Hi-CIS (80-20) 40 %  
Dispersante, humectante y portadores 40 %  
Butóxido de Piperonilo 10 %  
N-Octyl (MGK 264) 10 %

**Descripción:**  
Insecticida y acaricida de última generación, su nueva fórmula cuenta con un excelente poder residual debido a su formulación como polvo humectable que no tiene olor, no mancha, ni tapa boquillas. Es ideal para trabajar en áreas con problemas de resistencia ya que está doblemente sinergizado.

**Uso:**  
Insectos voladores y rastreros.  
**Forma de aplicación:**  
Se aplica con cualquier equipo profesional para fumigar.  
**Dosis:** 10 a 20 g por cada 4 L de agua.  
**Presentaciones:**  
-Exhibidor con 25 sobres con 10 g c/u  
-Tarro con 250 g.



### DIAMAL®

Rodenticida en cereal  
RSCO-URB-RODE-511-351-005-0.005

**Fórmula:**  
Bromadiolona 0.005%  
Ingredientes Inertes 99.995%

**Descripción:**  
Rodenticida en cereal actúa en una sola ingesta a base de un anticoagulante de segunda generación (Bromadiolona) para el control de ratas y ratones, altamente palatable.

**Uso:**  
Todo tipo de instalación.  
**Dosis:** Rata noruega y de tejado, colocar 50 g - 150 g en distancias de 5 metros.  
Ratón doméstico 25 g en distancias de 3 a 4 metros.  
**Presentaciones:**  
Cereal: cubeta con 5 kg y costal con 25 kg.



### DIAMAL®

Rodenticida parafinado  
RSCO-URB-RODE-511-339-033-0.005

**Fórmula:**  
Bromadiolona 0.005 %  
Ingredientes Inertes 99.995 %

**Descripción:**  
Rodenticida formulado con un anticoagulante de segunda generación, que al ser consumido por el roedor, con una sola dosis, será suficiente para conseguir una dosis letal.

**Uso:**  
Sitios urbanos, instalaciones pecuarias o industriales.  
**Dosis:** Rata noruega y de tejado, colocar 50 g - 150 g en distancias de 5 metros.  
Ratón doméstico 25 g en distancias de 3 a 4 metros.  
**Administración:**  
Personal.  
**Presentaciones:**  
Cubeta con 5 kg con bloques de 10 g c/u



## ● DETERGENTES

### DETEX®

Detergente alcalino líquido desengrasante

**Fórmula:**  
Hidróxido de sodio % en peso 13  
Agentes limpiadores anfotéricos 11  
Agentes secuestrantes 18  
Tensoactivos no iónicos 16  
Vehículo cbp

**Descripción:**  
DETEX® es un detergente alcalino líquido, ideal para desengrasar instalaciones y equipos de uso pecuario. Permite la fácil remoción de materia orgánica y grasa. Puede ser utilizado con cualquier equipo, herramienta e instalaciones de producción animal: incubadoras, becerras, maternidades, corrales porcinos y/o bovinos, rastros, clínicas veterinarias, hospitales, etc.

**Uso:** Todo tipo de instalación.  
**Forma de aplicación:**  
Mochila de aspersión, hidrolavadora con lanza de aplicación o pistola espumadora (preferentemente) a media presión.  
**Dosis:** aplicación en aspersión 10 a 20 mL/L de agua, lo cual proporciona un rendimiento de 400 mL/m<sup>2</sup> aplicación en pistola espumadora de 10 a 20 mL/L de agua, lo cual proporciona un rendimiento de 200 mL/m<sup>2</sup>.  
**Presentaciones:**  
Porrón de 25 L.



## ● DESINFECTANTES

### TH4+®

Desinfección total solución  
Reg. S.A.G.A.R.P.A.Q-7833-118

**Fórmula:**  
Didecil-dimetil amonio 18.75 g  
Alquil-dimetil-benzil cloruro de amonio 50.00 g  
Octil-dicildimetil-cloruro de amonio 37.50 g  
Dioctil-dimetil-cloruro de amonio 18.75 g  
Glutaraldehído 62.50 g  
Aceite de pino 20.00 g  
Terpineol 20.00 g  
Vehículo cbp 1000 mL

**Descripción:**  
Desinfectante de amplio espectro de acción; es una mezcla sinérgica de Glutaraldehído y 4 compuestos de Amonio Cuaternario que forman una 5ta generación. Eficacia comprobada en instalaciones, material orgánico y aguas duras. Elimina gérmenes patógenos como bacterias, virus, levadura y hongos.

**Uso:**  
Todo tipo de instalación.  
**Dosis:** 5 a 20 mL/L de agua dependiendo la cantidad de materia orgánica presente  
**Forma de aplicación:**  
Aspersión, inmersión, nebulización, termonebulización y espumado.  
**Presentaciones:**  
10 L, 25 L y 60 L.





**Salud animal**  
**Bienestar humano®**

**BOVINOS**

**OFICINAS GENERALES**  
**GUADALAJARA, JALISCO**

Av. España No. 1840 Col. Moderna  
C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco.  
Tel: 01 (33) 3678 1600  
Línea sin costo: 01 800 8327 266

[agropecuaria@pisa.com.mx](mailto:agropecuaria@pisa.com.mx)  
[www.pisaagropecuaria.com.mx](http://www.pisaagropecuaria.com.mx)

Síguenos en:

