

Birthright

SUSTITUTO LÁCTEO AL **100%**

TIPS PARA LA ALIMENTACIÓN MANUAL CON BIRTHRIGHT



**BIRTHRIGHT ES EL ÚNICO SUSTITUTO LÁCTEO PARA LECHONES
CUYO DISEÑO IGUALA LA CALIDAD DE LA LECHE MATERNA.**

La suplementación del lechón con Birthright puede:

1. *Reducir la mortalidad predestete.*
2. *Mejorar el peso al destete.*
3. *Ayudar a la cerda a mantener su condición corporal.*
4. *Ayudar a suplementar cerdas que presentan fallas lactacionales.*
5. *Alcanzar mayor uniformidad de la camada.*
6. *Rescatar lechones huérfanos.*



PRIMERAS RECOMENDACIONES

Debe asegurarse que todos los lechones reciban calostro adecuadamente después del nacimiento.

- **Dé atención individual** a los lechones pequeños que estén por debajo de 1.1 kg en cuanto nazcan. Seque a todos los lechones y póngalos bajo la lámpara.
- **Se recomienda** una dosis de **First Pulse D** (2cc) después de nacer.
- **Asegúrese** que todos los lechones hayan tomado calostro, ayude y marque a cada lechón que haya sido calostrado. Se recomienda proporcionarles una segunda toma de calostro en el primer día (15 a 20 ml por lechón).
- **Reacomode** a los lechones pequeños (12 horas después del nacimiento) con una cerda de segundo o tercer parto con buen nivel de producción láctea. Las primerizas no deben ser usadas como nodrizas.

INDICACIONES DE USO

Camadas suplementadas: Agregue 130 g de **Birthright** por 870 ml de agua para preparar 1 L de solución. **Birthright** deberá ser suplementado 24 horas después del nacimiento hasta los 17-18 días de vida del lechón.

Camadas grandes: Incremente la cantidad a 150 g por 850 ml de agua para preparar 1 L de solución.

*Si se presenta diarrea mezcle 180 g de **Birthright** por 820 ml de agua por 1 L de solución.

Camadas con pérdida de condición en los lechones y/o cerdas con poca producción de leche: Preparar una concentración de 180 g por 820 ml de agua para 1 L de solución.

Camadas huérfanas: agregue 200 g de **Birthright** por 800 ml de agua para preparar 1 L de solución. Seguir el protocolo para manejo de lechones huérfanos.

• Añada 0.5 ml de **Regano líquido** por 1 L de solución.

TIPS DE ALIMENTACIÓN CON BIRTHRIGHT

La mayor mortalidad ocurre en los tres primeros días después del nacimiento, para reducir esto la suplementación deberá iniciar a las 24 horas.

- 1. Los lechones** deberán establecerse en la ubre antes de iniciar la suplementación, esto se lleva 24 horas. En camadas donde se realice la homogenización, comenzar a las 36 horas después del nacimiento. No debe esperar demasiado ya que los lechones más grandes se acostumbrarán a la alimentación de la cerda y será más difícil que acepten el sustituto de leche.
- 2. La leche deberá suministrarse** a temperatura ambiente para evitar el sobreconsumo.
- 3. Birthright contiene Regano**, que es un saborizante y estabilizador de la leche.
- 4. En climas calientes** (verano, climas tropicales) o cuando hay una pobre calidad del agua, la leche tiende a desestabilizarse rápidamente.
 - Añada una dosis extra de **Regano líquido** de 0.25 a 0.50 ml por 1 L de leche.

- Añada una solución clorada en un rango de 8 ml por 1 L de leche. **NUNCA** las dos al mismo tiempo.
- Suministre leche fresca por lo menos dos veces al día.

5. Los primeros días es suficiente con llenar el fondo del alimentador.

6. No utilice charolas abiertas o platos para preiniciadores.

7. Para estimular el consumo sumerja la nariz del lechón en la leche. Una vez que uno o dos lechones comienzan a beber, los demás aprenderán por imitación.

8. Para estimular el consumo mantenga leche fresca y disponible la mayor cantidad de horas en el día.

9. Es necesario revisar a los lechones 24 horas después que se inicie la suplementación, si no están llenos es necesario alimentar a cada uno con 10 cc de **Birthright** (utilizar jeringa, perilla o tubo gastroesofágico).

10. Nunca deje que el alimentador se quede vacío, cuando esto ocurre al volverlo a llenar los lechones consumirán de más y esto puede ocasionar diarreas.

11. Nunca diluya la leche. Si esto ocurre, los cerdos consumen grandes cantidades de líquido, provocando diarreas y afectando los resultados esperados.

12. En camadas con buena madre puede retardarse el consumo de **Birthright**, ya que la cerda produce suficiente leche; esto no quiere decir que **Birthright** no sea palatable.

13. Mantenga el dispensador de leche limpio. Lávelo por lo menos una vez al día.

14. Coloque el dispensador en un área bien drenada, por delante de los hombros de la madre y lejos de la lámpara térmica.

15. Utilice agua potable para preparar la leche, de lo contrario tendrá un mezclado pobre. Las aguas duras o sucias enferman y parasitan a los lechones.

16. No agregue productos que contengan ácidos orgánicos en el agua que va a utilizar para reconstituir el sustituto de leche.

17. Almacene la leche Birthright en un lugar fresco y seco. Recomendamos guardar la leche en polvo en envases plásticos para que no adquiera olores de la maternidad.

18. Comience la alimentación con Pellet SEW entre el día 5-7 después del nacimiento. Se recomienda detener la suplementación láctea el día 17-18. Para estimular el consumo de **Pellet SEW** puede espolvorear **Birthright**.

19. Si los lechones comienzan a consumir grandes cantidades de leche **Birthright**, la cerda puede presentar mastitis, estimule el consumo de la leche de la cerda.

Los tips son únicamente para el uso de Birthright, no fueron diseñados para ningún otro sustituto de leche.



Para mayor información consulte al Servicio Técnico.

Boulevard Anacleto González Flores No. 359

Col. Centro, Tepatlilán de Morelos, Jalisco, México
(378) 782 2780

contacto@mx.wisium.com

www.wisium.com

DISTRIBUIDO POR:

wisium

NUTRITION & BEYOND